

西藏波密发现鸦嘴卷尾

Crow-billed Drongo (*Dicrurus annectans*) Found in Pome, Tibet

2014年10月26日,在西藏自治区林芝地区波密县易贡乡巴玉村恰青臧布河谷的落叶阔叶林中(30°21'03.54"N, 94°50'47.68"E, 海拔2 473 m)发现一具亚成体鸦嘴卷尾(*Dicrurus annectans*)尸体,标本号XZBM001,保存于湖南师范大学标本馆。附近还发现有红头噪鹛(*Garrulax erythrocephalus*)、黄腹扇尾鹀(*Rhipidura hypoxantha*)和黄颈凤鹛(*Yuhina flavicollis*)等鸟类活动。鸦嘴卷尾为单型种,国内已知分布于云南西部和南部、广西、海南和印控藏南地区(Carol et al. 1991, 赵正阶 2001, 郑光美 2011, 刘迺发等 2013)。

该鸟体重50.6 g,体长256 mm,嘴峰长24.6 mm,翅长138 mm,尾长122 mm,跗跖长19.9 mm。嘴粗厚似鸦嘴,上体色黑,顶冠、背、翼上覆羽、腰、飞羽和尾羽外翮具蓝色金属光泽,额、眼先及耳羽黑色不具金属光泽;下体黑色,胸腹缀蓝色金属光泽而较上体弱,羽端具白色浅横斑,尾下覆羽白色羽端明显,少数翅下覆羽和腋羽端部中央具细小白斑;尾呈浅叉状,最外侧一对尾羽向外曲,微向上弯曲;脚和嘴均为黑色。经解剖查看生殖腺,确认为雌性个体。

鸦嘴卷尾4至7月通常繁殖于海拔900 m以下的低山丘陵和山脚平原,繁殖期后有游荡习性(赵正阶 2001),罕见于海拔1 700 m(Craig 2005),此次亚成体鸦嘴卷尾在10月底发现于波密海拔2 473 m处,有可能是繁殖期后游荡至此,其在波密的居留型仍待进一步研究。

致谢 感谢审稿专家的指导和波密县林业局以及向导多吉平措、格桑罗布提供帮助。

石胜超^① 张超^② 吴倩倩^③ 任锐君^① 刘务林^③ 邓学建^{①*}

① 湖南师范大学生命科学学院 长沙 410081; ② 国家林业局中南林业调查规划设计院 长沙 410014;

③ 西藏自治区林业调查规划研究院 拉萨 850030

* 通讯作者, E-mail: dxj8871922@163.com;

第一作者介绍 石胜超,男,硕士研究生;研究方向:野生动物保育与利用; E-mail: biomen@foxmail.com.

收稿日期: 2015-03-30, 修回日期: 2015-06-21 DOI: 10.13859/j.cjz.201504021