

## 浙江龙泉发现斑尾鹃鸠

### Barred Cuckoo Dove (*Macropygia unchall*) Found in Longquan, Zhejiang Province, China

2014年7月11日,在浙江省西南部龙泉市凤阳山-百山祖国家级自然保护区石梁岙村(27°54'19.30"N, 119°11'6.90"E)利用红外相机(Ltl 6210)拍摄到2只斑尾鹃鸠(*Macropygia unchall*) (图1)。



图1 斑尾鹃鸠

Fig. 1 Barred Cuckoo Dove

尽管斑尾鹃鸠在《中国鸟类野外手册》一书中的分布图覆盖了部分浙江省(约翰·马敬能等 2000),但《浙江动物志·鸟类》(诸葛阳 1990)、《中国鸟类分类与分布名录》(郑光美 2011)、《凤阳山自然资源考察与研究》(洪起平等 2007)这些专著以及文献“浙江鸟类研究”(朱曦等 1998)和“浙江鸟类名录更新”(Chen et al. 2012)均无该鸟在浙江分布的记录。根据文献记述(中国野生动物保护协会 1995, 约翰·马敬能等 2000),斑尾鹃鸠全长32~41 cm,尾较长,头灰,颈背呈亮蓝绿色。胸偏粉,渐至白色的臀部,中央尾羽褐色,背和尾满布隐约的栗色横斑。栖于山地、丘陵树林,通常成对或集小群活动。斑尾鹃鸠分类上隶属鸽形目(Columbiformes) 鸠鸽科(Columbidae),在我国分布

有2个亚种:*M. u. minor*亚种为留鸟,见于福建、江西、广东、香港、海南等地,在上海和台湾金门有过迷鸟记录;*M. u. tusalia*亚种为四川中部的夏候鸟,云南南部的留鸟(郑光美 2011, 萧木吉等 2015)。该种在国内的野外种群数量不详,已被《中国脊椎动物红色名录》评估为近危物种(Near Threatened)(蒋志刚等 2016)。此次红外相机拍到该物种活动,证明其在浙江西南部靠近福建的区域确实有分布。

李 佳<sup>①</sup> 叶立新<sup>②\*</sup> 李迪强<sup>①</sup> 刘 芳<sup>②\*</sup> 刘胜龙<sup>②</sup> 彭 辉<sup>②</sup>

① 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所, 国家林业局森林生态环境重点实验室 北京 100091;

② 浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区 龙泉 323700

基金项目 浙江省凤阳山-百山祖国家级自然保护区野生动物调查项目;

\* 通讯作者, E-mail: liufang.caf@foxmail.com;

第一作者介绍 李佳,男,博士研究生;研究方向:野生动植物保护与利用; E-mail: lijia2530@126.com;

# 共同第一作者 叶立新,男,高级工程师;研究方向:野生动植物保护与利用; E-mail: lqyelx@163.com.

收稿日期: 2016-09-22, 修回日期: 2016-11-11 DOI: 10.13859/j.cjz.201606023