

云南鹤庆发现白眉田鸡

White-Browed Crake (*Porzana cinerea*) Found in Heqing, Yunnan

2016年11月5日,作者在云南省大理市鹤庆县草海湿地(26°36'13"N, 100°11'27"E, 海拔2193 m)观察到一只秧鸡科(Rallidae)鸟类:体长约20 cm;嘴较短,基部红色,端部黄色;黑色过眼纹上下具两条醒目白色条纹;喉近白;颈侧及胸灰色;背部暗褐,羽缘色浅;尾短而尖,微上翘;尾下覆羽皮黄色。经查阅相关文献确定该鸟为白眉田鸡(*Porzana cinerea*)。发现时该鸟在近岸浅水处的细果野菱(*Trapa maximowiczii*)中觅食,并时常隐匿于菰(*Zizania latifolia*)丛中,不甚惧人。

白眉田鸡的主要分布范围包括中南半岛、大巽他群岛、苏拉威西岛、马鲁古群岛、小巽他群岛、新几内亚、澳大利亚北部,东至密克罗尼西亚、美拉尼西亚、波利尼西亚(Taylor 1996)。在我国见于四川西昌,广西的宁明、百色、南宁(余丽江 2015),香港米埔(Kennerley 1992),台湾高雄右昌、屏东和龙鸾潭等地(林文宏 1997)。

经查阅《中国鸟类分类与分布名录(第二版)》(郑光美 2011)、《中国鸟类志:非雀形目》(赵正阶 2001)、《云南鸟类志(上下卷)》(杨岚等 1994, 2004)、《中国鸟类野外手册》(约翰·马敬能等 2000)等相关学术著作及网络数据库,云南省尚无白眉田鸡分布的报道,故此次观察为该种在云南省的首次记录。

白眉田鸡一般出现在低海拔湿地,在新几内亚罕见地出现在海拔1830 m处(Taylor 1996),本次记录应为已知的最高海拔记录。根据相关研究,白眉田鸡在近几十年中很可能呈快速北扩的趋势(Duckworth et al. 2007, 余丽江 2015),2012年之后在广西、四川、云南的记录可为此观点提供支持,但具体的种群状况尚需进一步调查和研究。

白皓天^① 陈可欣^② 曹丹阳^③ 吴兆录^{①*}

① 云南大学生态学与地植物学研究所 昆明 650091; ② 云南大学公共管理学院 昆明 650091;

③ 云南大学生态学与环境学院 昆明 650091

基金项目 国家自然科学基金项目(No. 41471149);

* 通讯作者, E-mail: zlwu@ynu.edu.cn;

第一作者介绍 白皓天,男,博士研究生;研究方向:生态学与保护生物学; E-mail: baiht@outlook.com。

收稿日期: 2016-11-21, 修回日期: 2017-03-06 DOI: 10.13859/j.cjz.201703024