

辽宁朝阳和大连发现噪鹛

Common Koel *Eudynamys scolopaceus* Found in Chaoyang and Dalian, Liaoning Province, China

噪鹛 (*Eudynamys scolopaceus*) 隶属于鹛形目 (Cuculiformes) 杜鹃科 (Cuculidae), 是一种专性巢寄生鸟类。在我国共分布有华南亚种 *E. s. chinensis* 和海南亚种 *E. s. harterti* 两个亚种, 海南亚种目前只分布于海南, 留鸟; 华南亚种分布比较广泛, 在北纬 35° 以南大部分地区都有分布, 为夏候鸟 (约翰·马敬能等 2000), 在河南、陕西南部、四川、重庆、贵州、湖北、湖南、安徽、江西、江苏、上海、浙江、福建、广东、香港、澳门、广西、台湾均有分布, 分布最北线为北京 (郑光美 2011)。除此之外, 米小其等 (2016) 曾报道过噪鹛在西藏地区的分布记录。辽宁老铁山国家级自然保护区曾于 2015 年秋季发现过噪鹛, 但并未见正式的学术报道。

噪鹛体型较大, 体长约 42 cm, 雌雄异型, 雄鸟通体黑色并具淡蓝色亮辉, 下体亮辉不显著; 雌鸟上体暗褐色, 略有金属绿色反光, 头部暗淡而显棕色, 整体密布白色点状斑, 在头部常集成纵纹状, 至尾部及飞羽上转为横斑状。虹膜红色, 嘴淡绿色, 脚灰色。鸣叫时发出嘹亮的 *kow-wow* 声, 特点极为鲜明, 辨识度极高。常借喜鹊 (*Pica pica*) 及红嘴蓝鹊 (*Cissa erythoryncha*) 的巢产卵 (赵正阶 2001)。

2017 年 5 月 28 日, 在辽宁省朝阳地区的凌源青龙河人工银白杨 (*Populus alba*) 林 (40°49'34.02"N, 119°05'35.53"E) 中观测到 2 只噪鹛雄性个体, 并录到其鸣声; 2017 年 6 月 25 日, 在距离第一次发现地 3.5 km 外的银白杨林 (40°48'11.91"N, 119°04'42.46"E) 再次听到噪鹛叫声。2017 年 6 月 19 日, 在辽宁省大连地区的庄河仙人洞国家级自然保护区小峪河的针阔叶混交林中 (40°00'55.11"N, 122°57'54.63"E) 听到噪鹛的叫声。结合噪鹛两个亚种已知的分布区来看, 本地区发现的噪鹛应为华南亚种 *E. s. chinensis*。另外, 在庄河地区有大量喜鹊分布, 而凌源地区有大量喜鹊及红嘴蓝鹊的分布, 这也为噪鹛的寄生提供了可能条件。

查阅《辽宁动物志·鸟类》(黄沐朋等 1989)、《中国鸟类分类与分布名录》(郑光美 2011) 和辽宁鸟类分布相关文献资料 (邱英杰等 2006), 确定噪鹛为辽宁省鸟类新分布记录。

张雷^① 董飞^① 付化瑞^② 张文文^③ 万冬梅^{①*}

① 辽宁大学生命科学学院, 辽宁省动物资源与疾病防治重点实验室 沈阳 110036;

② 北票市林业局 北票 122100; ③ 环境保护部南京环境科学研究所 南京 210042

基金项目 国家自然科学基金项目 (No. 31071927, 31100271), 环境保护部生物多样性保护专项;

* 通讯作者, E-mail: wandongmei@lnu.edu.cn;

第一作者介绍 张雷, 男, 实验师; 研究方向: 鸟类生态学; E-mail: zhangl@lnu.edu.cn。

收稿日期: 2017-07-08, 修回日期: 2017-10-24 DOI: 10.13859/j.cjz.201801025