

吉林向海发现白颊黑雁

Barnacle Goose (*Branta leucopsis*) Found in Xianghai, Jilin Province

2018年5月3日傍晚在位于吉林省白城市通榆县的吉林向海国家级自然保护区鹤类核心区青年坝附近(44°59'51.5"N, 122°17'52.1"E, 海拔168 m)使用NIKON-D4相机800 mm定焦镜头拍摄到1只黑白相间雁类, 拍摄距离约120 m。经查阅相关文献(段文科等 2017)确定本次发现的鸟类为白颊黑雁(*Branta leucopsis*)。

白颊黑雁为雁形目(Anseriformes)鸭科(Anatidae)黑雁属鸟类, 鸟体长约60~70 cm, 体羽灰色, 脸部为白色, 头部、颈部和上胸部为黑色, 嘴黑色并在眼睛前形成一块明显的小三角, 腹部则为白色, 翅膀银灰色并伴有黑色条纹, 脚黑色(段文科等 2017), 该鸟种主要分布在欧洲地区和北冰洋沿岸, 国内偶见于河南和湖北(郑光美 2017), 繁殖期主要在极地苔原带的泥滩和湿苔草甸栖息, 非繁殖期多栖息于低地草甸、滩涂和盐沼附近的

海岸(段文科等 2017)。



图1 白颊黑雁(左)与灰雁(右)(李连山 摄)

Fig. 1 Barnacle Goose (left) and Graylag Goose (right) (Photo by LI Lian-Shan)

发现地位于核心区青年坝芦苇湿地与草甸交汇处, 白颊黑雁与1只灰雁(*Anser anser*)在一起(图1), 混群的水鸟还有翘鼻麻鸭(*Tadorna tadorna*)、黑翅长脚鹬(*Himantopus himantopus*)、鸿雁(*A. cygnoides*)等。观察发现白颊黑雁大部分时间选择在草甸觅食, 吃植物嫩芽或种子, 偶尔在附近芦苇湿地喝水或嬉戏, 8月29日迁离向海。查阅相关文献(黑龙江野生动物研究所 1992, 常家传等 1995, 王海涛等 2012, 郑光美 2017)未见该鸟种在东北分布的记述, 因此确认其为我国东北地区鸟类分布新记录种。由于本次发现白颊黑雁的时间正值候鸟迁徙季节, 而且只发现1只, 因此判断白颊黑雁在向海应属罕见迷鸟。

张科^① 李连山^② 王深红^① 刘吉平^{①*} 林宝庆^② 李会芬^① 李琳^① 马寒星^①

① 吉林师范大学旅游与地理科学学院 四平 136000; ② 吉林向海国家级自然保护区管理局 白城 137215

基金项目 国家自然科学基金项目(No. 41071037), 吉林省科技发展计划项目(No. 20180101085JC);

* 通讯作者, E-mail: liujpjl@163.com;

第一作者介绍 张科, 男, 硕士研究生; 研究方向: 鸟类生态学; E-mail: jlsdzk@163.com。

收稿日期: 2018-07-10, 修回日期: 2018-11-16 DOI: 10.13859/j.cjz.201901021