

天津发现白额鸻

Streaked Shearwater *Calonectris leucomelas* Found in Tianjin

2017年11月4日上午11时左右,在天津市北大港湿地自然保护区的万亩鱼塘(38°47'15.33"N, 117°25'3.98"E, 海拔3 m)观察到1只白额鸻(*Calonectris leucomelas*)飞过,并拍照记录。此后数日前往观察,均未能再看到此鸟。被观察到时,该白额鸻的飞行高度约60 m;当时同域空中有红嘴鸥(*Chroicocephalus ridibundus*)、红嘴巨燕鸥(*Hydroprogne caspia*)、西伯利亚银鸥(*Larus smithsonianus*)等鸥类飞过,同域水面有大群的白骨顶(*Fulica atra*)、赤膀鸭(*Mareca strepera*)、罗纹鸭(*M. falcata*)、小天鹅(*Cygnus columbianus*)等水鸟。所发现的白额鸻头灰白,腹部、翅下白,初级飞羽黑色,喙大部分肉粉色,尖端突起并沾黑。

白额鸻隶属于鸻形目(Procellariiformes)鸻科(Procellariidae)(del Hoyo et al. 2017),主要分布于西太平洋,在我国东部到东南沿海均可见到(约翰·马敬能等 2000,赵正阶 2001,赵欣如 2018),包括辽宁东南部、山东东部、安徽、江西、江苏、上海、浙江、福建、广东、香港、海南、台湾(郑光美 2017),繁殖于山东青岛附近的沿海岛屿(刘岱基等 1993,赛道建 1993,崔志军 1994),此前在天津尚无确切记录。通过现场观察和查阅野外记录,综合华北地区的记录,确认白额鸻为天津市鸟类分布新记录种。

致谢 感谢张旻昊先生、黄瀚晨先生、阙品甲先生在物种鉴定和资料收集方面给予的帮助。

娄方洲^① 莫训强^{②*}

① 北京一零一中学 北京 100091; ② 天津师范大学地理与环境科学学院 天津 300387

基金项目 天津市自然科学基金项目(No. 18JCQNJC78200);

* 通讯作者, E-mail: 421973@163.com;

第一作者介绍 娄方洲,男,中学生; E-mail: larry1010@163.com。

收稿日期: 2018-12-03, 修回日期: 2019-01-11 DOI: 10.13859/j.cjz.201903016