

黄颡鱼对鱼苗的危害

黄颡鱼和鳊鱼、鲢鱼、黑鱼、鲇鱼等一样，是淡水养殖鱼类的敌害。我们曾在宜昌地区水产养殖场江口——大埠街 189 部绠网的捞箱里于一个月內捕获黄颡鱼 537 尾，总重 60.6 斤。虽然绠网的捞箱里除鱼苗外，还有糠虾、水生昆虫等，但黄颡鱼的肠含物经解剖检查，尽是鱼苗，充塞度达五级。进入捞箱的黄颡鱼自 13.7 至 30.5 厘米不等，但 13.7—24 厘米的鱼摄食鱼苗的数量几乎相同。

黄颡鱼在我国分布很广，产量也不低，有一定的经

济价值。但由于它是一种广食性的肉食鱼类，故它不仅对喜在植物上产卵的鲤、鳊、鲫、团头鲂等养殖鱼类的天然繁殖有很大危害，而且在江河、湖泊产苗水域摄食鱼苗。为此，在继续推行采苗操作五勤（勤试、勤移、勤洗、勤留、勤研究）的同时，还应注意勤除敌害。另外，应在张绠设网的附近水域增设渔具，捕捞包括黄颡鱼在内的鲇科鱼类和其他肉食性鱼类，以提高渔获量和保护水产资源。

（湖北省秭归县水产科 冯逸鸣）