

鸩 鸟 考

庞 秉 璋

(上海纺织第二医院)

我国古籍有关于有毒鸟类的记载，其中述及较多而奇特的莫过于鸩，称其肉与羽等有毒，可致人于死，但能疗蛇毒。然鸩为何鸟，现今可知，颇费思索，兹据资料，试作考释。

甲骨卜辞无鸩字。鸩的记述始见于春秋时期。其后，代有书载，今归列名称、形色、习性、毒性及分布五项，逐项解析。

一、名称 鸳多别名，雌雄各异。别名：鸩曰《说文》，淮南子，名医别录，广雅》。同力鸟

《名医别录》。鸩，曼鸟，云白《蠕范》。鸩鵝《康熙字典》。雌雄：雄名运曰《尔雅翼》；先顾，蠮《蠕范》。雌名阴谐《尔雅翼》，蠮《蠕范》。

二、形色 春秋战国时期虽有记载，少述形色。如《左传》，《国语》说鸩而仅言有毒。《离骚》有“吾令鸩为媒兮，鸩告予以不好”句，亦无描述。周和西汉成书的《山海经·中山经》称鸩“其状如雉”。后书稍详，郭璞曰：“鸩大如鵠，紫绿色，长颈，赤喙”。《广志》谓“鸩形似鹰，大

如鶡，毛黑，喙长”。《名医别录》鶡“状如孔雀，五色杂斑，高大，黑颈，赤喙”，“鶡曰状如黑伦鸡”。《汉书注》引应劭曰：“鶡鸟黑身，赤目”。《尔雅翼》“鶡似鹰而大，状如鶡，紫黑色，赤喙，黑目，颈长七八寸”。《铁崖集》“状如训狐”。《康熙字典》引《博物志》注曰：“鶡一曰鶡，羽如雀，黑头，赤喙”。《蠕范》“状如鶡，紫黑色，喙长七八寸，黄赤如铜，尾有猝(五色杂合)文，背上连钱文，足三距”。

综上所述，鶡的概形可归纳为四种类型。(一)如鸡形目(似雉·孔雀)。(二)如隼形目(似鹰)。(三)如鶡形目(似鶡，训狐)。(四)如鹤形目(似黑伦鸡)。体色大致有两种类别。(一)斑(五色杂斑·羽如雀)。(二)黑，紫，绿。不论体色如何，喙色大都称赤。目赤或黑。

三、习性 《山海经·中次十经》“恒食蠭(蠭蠐螬)”。郭璞曰：“食蝮蛇头”。《广志》“食蛇及橡实”。《玉篇》“食蛇”。《名医别录》“啖蛇”，“作声似云同力”。《汉书注》“食蛇，野葛(*Pueraria lobata* 产我国各地)”。《尔雅翼》“运曰鸣则晴，阴谐鸣则雨”，“食蛇及橡实，知木石有蛇，即为禹步(巫师、道士作法时的一种步法)以禁之”。《铁崖集》“声如击腰鼓，巢于大木之颠”。《蠕范》“运曰知晏(天气晴朗)，阴谐知雨，各应时而鸣，其声如击腰鼓，好食蝮蛇、橡实，蛇入口即烂……善禹步禁法，知巨石大树间有蛇虺，则进退仰伏，或独为，或结群，须臾石崩树倒而蛇虺出矣。常巢木颠”。《岛居随录》“鶡步则蛇出”，“能辟蛇”。

归纳起来，鶡食蛇(包括蝮蛇)，橡实，野葛，蠭。食蛇时有特殊姿态。鸣声如“同力”及击腰鼓。巢于木颠。

四、毒性 鶡鸟有毒，古称羽可为毒酒。《国语·晋语》“置鶡于酒”。《国语·鲁语》“晋人执卫成公归之于周，使鑿鶡之，不死”。《汉书》“到长安鶡杀之”。《汉书·齐悼惠王传》“太后怒，乃令人酌两卮鶡酒置前，令齐王寿”。《说文》“鶡，毒鸟也”。《后汉书》“皇后乘势忌恣，多所鶡毒”。《博物志》“鶡，药物，有大毒”。《名医别录》“毛有大毒，入五脏，烂杀人”，“人误

食其肉立死，并疗蛇毒。昔人用鶡毛为毒酒，故名鶡酒，顷不复尔”，“喙带之杀蝮蛇毒”。《玉篇》“毒鸟”，“其羽画酒，饮之即死”。《汉书注》“以其羽画酒中，饮之立死”。《唐本草》“其肉腥有毒，不堪啖云，羽画酒杀人，亦是浪证”。《太平御览》“鶡肉在俎，饿徒不食”。《尔雅翼》“其屎著石，石皆黄烂，饮水处，百虫吸之皆死，惟犀角可解”。《铁崖集》“巢下数十步，皆草不生也”。《本草纲目》称其喙“蛇中人，刮末涂之，登时愈也”。郝懿行曰：“体有毒，古人谓之鶡毒”。《蠕范》“矢屎著石，石烂，有鶡髓烂石之说，胆沾指，指断。羽沥酒，饮之杀人”，“巢下数百步，草木不生。饮水，百虫吸之皆死，惟犀角汁入其中则毒化”。

综观上述，可见鶡羽画酒有毒，即所谓鶡酒。体、肉、胆、屎、矢及饮过之水皆有毒，但羽及喙可疗蛇毒。

五、分布 《山海经·中山经》“女几之山……其兽多豕鹿，多白犀，其鸟多鶡”。“玉山……其鸟多鶡”。“瑤碧之山……有鸟焉，其状如雉，恒食蠭，名曰鶡”。《名医别录》“鶡生南海”，“出广之深山中”，并谓鶡曰“江东人呼为同力鸟”。《唐本草》“鶡出商州江岭间，大有人皆谙识”，“交广人亦云鶡曰即鶡”。《铁崖集》“鶡出蕲州，黄梅山中”。《岛居随录》“端州出云白鸟”。

由此可见，为广布性鸟类，不少地方有鶡。

考 释

鶡的形色，古籍各家所述有异同，或有因袭、转录、增广颇有出入。今有鸟类，无一能完全符合上述所有各家的叙述。因此有被认为是一种传说中的鸟，未必实有其物。如求尽同，今不存在，考虑为已经绝灭之鸟。若归纳类比，以现存鸟类引今证古，酷求形似，辅以习性、分布等项，或有助于考释。

一、地理 查考地理分布，对求证鶡鸟颇关其要。《山海经》女几山，当今河南宜阳县，俗名石鸡山。琴鼓山，不明，籍载此山之前有玉山及灌山；玉山，《山海经地理今释》考为四川宜宾西南朱提山。灌山，郁水出于其上，乌江支流

郁江由四川彭水经郁山镇至湖北汪家营。如灌山在此，则其东北百五十里，而东五十里，再东南二百里之琴鼓山，推测可能在川鄂相邻处。瑤碧山，欠详，籍载其“东四十里曰支离之山，济水出焉，南流注于汉”，王念孙、孙星衍、郝懿行等山校作攻离山，王念孙、郝懿行水并校作清水。清水即清河，源出河南嵩县西南攻离山，瑤碧与攻离相去四十里，此山可能在河南。

南海，先秦古籍或以为南方各族居地泛称，或有实际的海域可指。陶宏景据《神农本草》增广加注成《名医别录》，《神农本草》中365种药物无鸩，陶依汉魏以下名医用药增365种，其中有鸩。西汉后，东海方位既有定域，南海名称才用专指今南海，陶系南北朝人，所谓鸩生南海，即今之南海。另广东有南海县，广义的南海指南亚，西亚及印尼。陶言之“广”即广州，三国时辖境相当今广东、广西两省区除广东廉江以西，海南岛，广西桂江中上游、容县，北流以南、宜山以西北以外的大部分地区，南朝以后渐小。江东为自安徽芜湖以下的长江下游南岸地区，交广即吉交州及广州，唐代交州限于今河内附近一带。

商州，今陕西商县。大有，其地不明，据《古今图书集成·草木典》引《武强县志》中述明嘉靖廿二年（1543）大有县谷1茎2穗，按县志所载大多为就近风物，武强在河北省，推测大有是在河北境内。

蕲州，今湖北蕲春县。黄梅在其东南。端州，今广东肇庆市，高要和高鹤县西北部地方。

二、名实 鸟类的名称，种数和分布，古今容或不同，今按前述综合归纳的四种类型，分别以现有鸟类考证。

（一）鸡形目 陶说鸩如孔雀，五色（多种颜色，不一定五色）杂斑，结合《蠭范》尾有绎文，背有连钱文（如钱相连的圆斑），三距。据此体色及概形，莫如孔雀雉。孔雀雉学名的 *Polyplectron* 为多距之意。分布在东亚，东南亚及南亚地区。*P. bicalcaratum backeri* 在印度又名 Deoderick, Deo-durrug，谐音颇似同力，跗蹠有两或三距。我国有两个亚种；*P. b. bicalcaratum*

分布在云南，*P. b. katsumatae* 分布在海南岛。体色主为褐或灰，上体及尾羽有眼斑，具紫蓝绿辉。但喙非红色，体非黑色，喙颈不长，鸣声不似同力及击腰鼓，巢于地面，虽可能食橡实及野葛，不食蛇，可成群，粪成形而污染面小。陶言鸩与鵠曰为两种。《山海经》郭璞注如雉之鸩曰：“此更一种鸟，非食蛇之鸩也”，此乃陶言之鸩，与食蛇之鸩为同名异物。《唐本草》称鸩即鵠曰，又名同力鸟，更无如孔雀者，陶为人所诳，否定有同名异物，以为如鸡形目者非鸩。

（二）隼形目 前人以蛇鵟 *Spilornis cheela* 为鸩[Read(李德), 1932¹⁾; 朱建霞, 1936²⁾]。分布在东亚，东南亚及南亚地区。在印度阿萨姆称 Sin，谐声如鸩。国内有四个亚种，见于云南，贵州，两广，安徽，福建，台湾及海南岛。色褐及黑，羽有白色缘或褐色斑纹及白色点斑。头顶及羽冠黑，羽基白色。体多色，杂斑，但主要非黑色，喙颈不长，喙不赤，虹膜黄色，嗜食蛇，食时不呈禹步，不可能食橡实及野葛，不成群，鸣声如“kok-koks”，不似同力及击腰鼓。巢于高树，粪便稀薄，污染面大。体色及分布似陶言之鸩，与陶称之同力鸟及各家多数所述之鸩不同。

（三）鸮形目 体色大都杂斑，食蛇者有草鸮 *Tyto longimembris*, 鹰鸮 *Glaucidium cuculoides* 等。草鸮国内有两亚种，栖山麓草地，罕见，不成群，巢于草地，鸣声不似同力或击腰鼓，食蛇不呈禹步，见于浙江，福建，两广及台湾。鹰鸮，栖平原丘陵，巢于树洞，留居我国南部各省，国内有四亚种。本目鸟类体无多色，夜间活动，隐蔽不易见，与各家所说鸩之共同特征相违，体色不黑，非长颈长喙，喙不赤，巢不在大木之颠。

（四）鹤形目 陶说鸩曰别名同力鸟，亦即多家所说之鸩。味古斋本《本草纲目》鸩之图形

1) Read, B. E. 1932 Chinese Materia Medica Avian Drugs from Pen Tsao Kang Mu Peking Natural History Bulletin.

2) 乔风等编译 1936 中国普通动物(附录二《本草》中的禽类 朱建霞译述) 商务。

似鹤。陶说如黑色的伦鸡。按伦鸡即鸽鸡。《食
物本草》称“鸽鸡状如鹤大，而顶无丹，两颊
红”。《本草纲目》谓“鸽，水鸟也，食于田泽洲渚
之间，大如鹤，青苍色，亦有灰色者，长颈高脚，
群飞，可以候霜”。据此为白枕鹤，即鸩似黑色
之鹤。鹤与鹤类似，再以长颈，长喙，赤喙，赤目
或黑目而论，作者据考为黑鹤 *Ciconia nigra*。此
鸟下胸，腹，胁，尾下复羽白色，余部黑色有紫绿
辉。喙及目色赤（或黑）。《续博物志》：“鹤性
甘带（喜食蛇），每遇巨石，知有蛇，即如术士禹
步，其石防然而转”，此种习性的记述几乎与鸩
相同。黑鹤食蛇，见蛇捕食呈兴奋状态，至于石
转而崩，步而蛇出，则系夸张之词。单独或成群。
巢于树或穴。粪稀薄，污染面大，以喙相击发
“嗒嗒”之声，如击腰鼓，分布在新疆，青海，甘
肃，东北，河北，河南，陕西，四川，两广，湖南，江
西，长江下游，福建，台湾，云南，古籍所涉之地，

大都有分布。东亚及南亚亦有分布。多方面符
合古称之鸩。作者认为鸩或即黑鹤。

三、毒性 陶宏景已指出“昔人用鸩毛为
毒酒，故名酖酒，顷不复尔”，可见南北朝时已不
见用以作毒酒。唐苏恭称“羽画酒杀人，亦是浪
证”，言鸩羽有毒不可信。作者认为有毒之说，
可能源于两点。（一）鸩食蛇，食蝮蛇，因食毒
蛇，致被认为有毒。（二）羽画酒杀人，由偶合而
讹传。古鸩字通酖，酖意为毒酒或毒害，所谓饮
鸩止渴，即饮酖止渴。《左传·闵公元年》“宴安
酖毒，不可怀也”。酖与鸩通，引伸为鸩鸟有毒。
古时统治者惯用砒霜（三氧化二砷）为酖毒人，
画酒是用鸟飞羽挑砒入酒，划酒使化，古时记载
亦有毒之不死者，《国语·鲁语》“晋人执卫成公
归之于周，使嬖（医）鸩之（毒害），不死”。鸩鸟有
毒，殆非事实，屎矢烂石，为稀便着石，粪干后如
烂石。