

# 短耳鸮的室内饲养与观察

常家传  
(东北林业大学)

1983年1月得到一只短耳鸮 (*Asio f. flammeus*)，在办公室内饲养观察了三个月，现整理报道如下。

## 一、形态

短耳鸮的一对耳突较短，比头上其它羽毛约突出10毫米左右。安静时耳突竖立，受惊或取食和活动时，耳突反而呈平伏状，头顶变平坦。在剥制标本上耳突很不显著。

与其它某些鸟类不同，短耳鸮上眼睑可活动，而且两眼的上眼睑可分别活动。当睁一只眼闭一只眼时，睁着眼睛眼球可转动，也可眨眼。眨眼是出自本身的需要而不受外界影响，手触摸其眼毛时并不眨眼。虹彩有明显的伸缩能力，因而瞳孔可开大和缩小。

短耳鸮耳孔很大，约为眼直径的3倍。左右耳孔不对称，左耳孔偏上，右耳孔偏下，但在头骨上的耳孔是左右对称的。

与其它大多数鸟类不同，鸮类进食时上下嘴均可活动。然而在鸮的头骨标本上，上嘴基与头骨之间并无可动关节，仅在嘴基与额骨连接处有一条横沟(凹陷)，在活体时，可容许上嘴有一定程度的活动。

受惊时除耳突有变化外，面盘(翎领)的白色部分变得显露，片刻即消失。这种变化在面盘下部最明显，喉部黄白色羽毛在安静时两侧稍向上包卷，而在受惊时则平展开，变得更明显了。

站立时，两脚中趾稍向外撇，两中趾互成90°角而非互相平行，两外趾处在一条直线上，而两内趾相平行。

## 二、取食和食性

它通常白天不进食，而在夜里取食，饥饿时白天也吃食。开始时喂给猪瘦肉，它不吃，只好强制喂给，用镊子塞到嘴里，有时它还能吐出。对鼠类最喜食，遇小家鼠可整吞，对大家鼠则撕成片段吞下。对羊肉块不爱吃，强制喂给也可咽下。

进食时很警觉，听到异常声音就停止进食。同一种声响重复多次后，它也就不在意了。进食的姿势是两脚在地上捺住食物，用嘴啄撕。食物充足时常剩弃鼠头，说明它对鼠头并不特别爱好，和刚来时不同。从来不喝水。一昼夜排便18次。

## 三、反应和行为

和红隼对红色的惊觉不同，短耳鸮对红色无反应，说明它可能是色盲。对击掌响声，头部微有颤动。

白天躲在一个地方不动，夜里在室内多次飞动，有时把高处的东西给碰掉地上。白天从未见其睡眠，也可能改为深夜睡眠。夜里突然开灯时，它的瞳孔较白天为小，且眨眼时还收缩一下，过一会儿就和白天一样了。两眼若一只向光一只背光，则向光者瞳孔小，背光者瞳孔

大。

人手在它面前晃动时，它无反应，但人头面部在它面前左右摆动，则它呈受惊状，两眼注视着人，随人头左右摆动而转动自己的头部。受

惊时嘴微张开，“哈、哈”出气，有时则上下嘴敲击“卡、卡”作响。

不喜欢钻洞，有洞亦不钻。