

山东发现震旦鸦雀

震旦鸦雀(*Paradoxornis h. heudei*)分布范围甚小,是我国的特有种。过去记录分布于我国南京、镇江和江阴等长江下游地区,近年来在上海崇明,江苏高邮湖、洪泽湖、新洋湖、盐城沿海滩涂等地均获得标本。作者于1988—1989年在临沭县芦庄发现震旦鸦雀,并获标本,为山东省鸟类新纪录。

量度:体重15—18g、体长192—193mm,嘴峰16mm,翼长69—70mm,尾长117—118mm,跗蹠25mm。

震旦鸦雀雌雄形态相似。颈和颊、喉粉红色。头顶灰棕色。具宽阔的眉纹,眉纹上缘黑褐色,下缘黑色显著,延伸至后颈两侧。飞羽黑褐色,三级飞羽黑色,羽缘棕栗色。肩羽和翼上覆羽栗红色。中央尾羽棕栗色、外侧尾羽棕色近白外,其余尾羽黑褐色,羽端棕色。嘴短粗而侧扁,呈蜡黄色。跗蹠肉黄色。

1988年冬,在山东省临沭县与江苏省东海县交界处的芦苇丛中发现二百多只震旦鸦雀觅食活动,一般数只至20只,最多见50只集群,食物以昆虫和虫卵为主,兼食芦苇种子。

震旦鸦雀在5月上旬开始营巢,营巢期为7—8天,巢悬于3—5根芦苇丛中,巢呈圆杯状,向上开口,巢高10cm,外径8cm,内径5cm,巢深6.5cm。巢材主要为芦苇叶鞘、叶片和纤维等。5月中旬产卵,每日产卵一枚,每窝3—4枚。卵重2g,直径18.5mm×14.5mm。卵呈卵圆形,淡黄近白,具栗褐色斑点,钝端斑点粗且密,色深,尖端斑点疏而细。

震旦鸦雀在山东的发现,且为留鸟,这在地理分布上具重要意义。

柏 亮(山东临沂师范专科学校生物系,276000)

柏玉崑(山东郯城县教育局教研室,276100)