

贵州雷公山亦有白颈长尾雉分布

梁 伟

(黔东南教育学院生化系 凯里 556000)

关键词 白颈长尾雉 分布

白颈长尾雉 (*Syrnaticus ellioti*) 国内主要分布于安徽南部、浙江、江西、福建和广东北部等地(郑作新, 1976年)。近年来广西和湖南等地也见有其分布。杨岚等1988年曾在贵州东北部铜仁地区采到白颈长尾雉标本*。1992年吴至康等在江口一带首次发现白颈长尾雉**, 从而确认贵州东北部有分布之后, 最近, 我们在雷公山也发现了白颈长尾雉。

雷公山位于贵州省东南部, 东经 $108^{\circ}05' - 108^{\circ}24'$, 北纬 $26^{\circ}15' - 26^{\circ}32'$, 地跨雷山、台江、剑河、榕江四县之间, 属苗岭山脉, 为长江和珠江水系的分水岭高地。1992年2月, 我们在雷公山方祥进行鸟类考察时, 方祥附中李正权说该村捕得白颈长尾雉(当地称傻雉), 并提供了两枚雄性尾羽。5月, 笔者在雷公坪核心区(海拔1850m)路边拾到两枚雄性白颈长尾雉尾羽。1993年2月20日, 我们在小雷公坪水塘溪沟冷竹林丛中(海拔1700m, 散布有水马桑、茅栗、青冈、樱等乔木)见到一只惊飞的雌性白颈

长尾雉, 并于其起飞处下溪边发现一被残食的雄性白颈长尾雉。残骸仅余双翅、部分尾羽及羽毛、二附趾和胸骨, 骨上所附肌肉尚未霉烂, 整理度量如下: 翅长230mm, 附趾76mm, 距29mm, 足中趾66mm, 尾长(残存)277mm。1993年1月24日—3月12日在雷公山各村寨调查时从群众家中得许多当年及前些年收藏的白颈长尾雉尾羽、羽毛。3月15日, 黄里乡一姓李农户获一活的雄性白颈长尾雉, 体重1100g, 体长805mm, 翅长198mm, 喙长38mm, 附趾59mm, 距长22mm, 尾长468mm。该雉现饲养于黔东南教育学院生化系实验楼。

雷公山自然保护区面积47300公顷, 为我国中亚热带东部偏湿性常绿阔叶林的典型山地环境, 是白颈长尾雉等雉类的良好栖息地。但

* 卢汰春主编。中国珍稀濒危野生鸡类 福州 福建科学技术出版社, 1991, 399—404。

** 中国动物学会鸟类学分会 全国鸟类环志中心 中国鸟类研究简讯, 1992, 1(2): 2。

由于交通不便及其他原因,鸟类调查工作不多,加上群众的保护意识较差,致使乱捕、滥猎、误杀珍禽等现象时有发生,严重危及其生存繁衍。为此,急需对雷公山的白颈长尾雉等雉类的分布、种群数量等方面做进一步的调查,为搞好保

护工作提供科学依据。

致谢 承北京师范大学生物系张正旺老师鉴定标本和指导审阅;侯兴发、侯昌龙、李正权、侯天武、顾永成同志协助野外工作。