

山东曲阜发现蓝额红尾鹟

Blue-fronted Redstart (*Phoenicurus frontalis*) Found in Qufu, Shandong Province

蓝额红尾鹟 (*Phoenicurus frontalis*) 属雀形目 (Passeriformes) 鹟科 (Turdidae), 分布于中国中部、青藏高原、喜马拉雅山脉; 越冬至缅甸西南部及印度支那北部。在我国西南部常见, 繁殖于西藏南部、青海东部及南部、甘肃南部、宁夏、陕西南部秦岭、四川、贵州和云南的高海拔山区。冬季移至繁殖地域内的较低海拔处, 部分鸟往南迁移; 在中国为留鸟 (郑光美 2011)。

2017年1月15日, 在济宁曲阜市九仙山 (35°47'53.43"N, 116°59'44.31"E, 海拔196.5 m) 观察到一只蓝额红尾鹟雄性个体, 该鸟色彩艳丽, 头部和胸部蓝色, 颈部蓝色不明显, 接近褐色且夹杂灰白斑纹, 两翼黑褐色, 翅膀有一道白色翼斑, 腹部、两胁和臀部橙色, 尾羽端部黑色, 似第一年冬雄性个体。2017年3月8日, 在距离第一次发现蓝额红尾鹟地点大约100 m远的灌丛中, 再次记录到1只, 该个体额部亮蓝色明显, 似成年雄性个体。

通过观察其外貌特征和活动状态, 可以很大程度排除逃逸鸟或放生鸟的可能性, 经查阅中国观鸟记录中心 (<http://www.birdreport.cn>) 等数据库, 发现该鸟已经在江苏省镇江市句容市赤山湖被多次记录, 初步推测是自然扩散个体。

经查阅相关文献 (郑光美 2011, 赛道建 2013) 和网络数据库, 该鸟种为首次在山东省境内发现, 确定为山东省鸟类新纪录。

孙风菲 杨月伟* 聂圣鸿 马士胜 高晓冬

曲阜师范大学 曲阜 273100

基金项目 国家自然科学基金项目 (No. 31672314);

* 通讯作者, E-mail: yangyuewei@163.com;

第一作者介绍 孙风菲, 女, 本科; 研究方向: 动物生态学; E-mail: m17865515089@163.com。

收稿日期: 2017-03-13, 修回日期: 2017-05-02 DOI: 10.13859/j.cjz.201703022