

江苏阜宁县发现灰背椋鸟

White-shouldered Starling (*Sturnia sinensis*) Found in Funing, Jiangsu Province

2018年6月25日7时左右,在江苏省阜宁县北部发现了一种椋鸟:通体灰色,头顶及腹部偏白,飞羽黑,外侧尾羽羽端白色;肩部有较明显的白色,翅膀黑色,喙和脚均为灰色(图1左)。根据整翼上覆羽及肩部白色这一特征,参照《中国鸟类野外手册》(约翰·马敬能等 2000)和《中国香港及华南鸟类野外手册》(尹琰等 2017),确定为灰背椋鸟(*Sturnia sinensis*)雄性个体。

灰背椋鸟繁殖于中国的南部,并在中国南部和亚洲东南部越冬,且繁殖的最北界为浙江省。该物种曾于2015年5月被观鸟爱好者在江苏如东沿海观察到,南通新闻进行过网络报道(http://www.zgnt.net/content/2015-05/22/content_2403848.htm)。2018年8月,中国鸟类记录中心也曾有江苏镇江京口区的分布记录(<http://www.birdreport.cn/Member/WatchRecord?id=31268>)。灰背椋鸟已知分布于中国云南东南部、四川西南部、贵州南部、湖北、湖南南部、江西、浙江、福建、广东、香港、澳门、广西、海南、台湾(郑光美 2017)。此次发现的具体地点为江苏省阜宁县三灶镇祖庄村西侧(33°51'39.72"N, 119°46'36.68"E, 海拔 - 3 m),发现的灰背椋鸟雄性个体与喜鹊(*Pica pica*)、乌鸫(*Turdus merula*)和树麻雀(*Passer montanus*)等混群,在村庄附近一片收割后的麦田内觅食(图1右),数量为2只。因此,灰背椋鸟在江苏应该有分布,其分布区的北缘可达苏北灌溉总渠沿线。



图1 江苏省阜宁发现的灰背椋鸟(左)及其觅食地生境(右)

Fig. 1 White-shouldered Starling (*Sturnia sinensis*, left) found in Funing, Jiangsu and its habitat landscapes (right)

致谢 感谢江苏观鸟会袁屏、邹维明和严少华在鸟类鉴定和物种分布方面的帮助。

王玄^① 刘威^② 常青^② 丁晶晶^{①③*}

① 江苏省林业科学研究院 南京 211153; ② 南京师范大学生命科学学院 南京 210023;

③ 江苏盐城滨海湿地国家定位观测研究站 南京 211153

基金项目 江苏省重点研发计划专项 (No. BE2018681), 生态环境部生物多样性保护专项;

* 通讯作者, E-mail: sunshinedjj@163.com;

第一作者介绍 王玄, 男, 硕士; 研究方向: 林业生态与野生动物保护; E-mail: xuanzaiwang@163.com.

收稿日期: 2018-08-03, 修回日期: 2018-11-08 DOI: 10.13859/j.cjz.201901023