

江西永修发现蓝额红尾鸫

Blue-fronted Redstart (*Phoenicuropsis frontalis*)

Found in Yongxiu, Jiangxi Province, China

2019年1月24日11:34时,在江西省永修县滩溪镇一村庄附近的百香果(*Passiflora edulis*)种植园内(29°00'58" N, 115°33'25" E, 海拔48 m, 周边大生境类型为亚热带常绿阔叶林)发现蓝额红尾鸫(*Phoenicuropsis frontalis*)雄鸟1只(图1)。该鸟头部为明显的亮蓝色,较北红尾鸫(*Phoenicurus aureoreus*)雄鸟头部颜色偏蓝,且头、背、颈与喉部无明显色差,均为亮蓝或深蓝,眼周有一明显的白圈,两翅暗褐色,无白色翼斑。中央尾羽黑色,外侧尾羽具黑色端斑。其余上下体羽橙棕色。喙部及脚部颜色与北红尾鸫无明显差异,均为黑色或深色。经查阅文献(黄小春等 2015, 郑光美 2017),以及中国观鸟记录中心(<http://www.birdreport.cn>)数据库,确定这是江西省首次记录到该物种。

蓝额红尾鸫隶属雀形目(Passeriformes)鹟科(Muscicapidae)(郑光美 2017),分布于山东、陕西南部、内蒙古西部、宁夏、甘肃、西藏、青海南部与东部、云南、四川、重庆、贵州、湖北、湖南、浙江和广东(约翰·马敬能等 2000, 郑光美 2017)。主要为留鸟,具有明显的垂直迁移现象,繁殖期主要栖息于海拔2 000~4 200 m的亚高山针叶林和高山灌丛草甸,冬季多迁移到低海拔的溪谷和林缘灌丛,也常见于路边、农田、茶园和居民点附近的树丛与灌丛中(赵正阶 2001)。从分布区看,该鸟主要见于我国的中部和西南地区(赵正阶 2001),在东部和东南地区偶有记录(中国观鸟记录中心 <http://www.birdreport.cn>)。目前已报道的蓝额红尾鸫零星分布记录地区包括山东(孙风菲等 2017)和本次记录地区江西,记录的个体数均为1只,且均记录于冬季,因此蓝额红尾鸫在这两个地区是否稳定分布,仍需更多观察以确认。



图1 蓝额红尾鸫雄鸟,
拍摄地点江西省永修县滩溪镇
Fig. 1 Male Blue-fronted Redstart,
Tanxi town, Yongxiu County,
Jiangxi Province

刘涛^① 徐永涛^① 苏英钰^① 莫柏^① 张微微^{①*} 王丹^②

① 江西农业大学林学院 南昌 330045; ② 盘锦职业技术学院 盘锦 124010

基金项目 国家自然科学基金项目(No. 31660603),江西省自然科学基金项目(No. 20161BAB204181),江西省科技支撑项目(No. 2012ZBF60009);

* 通讯作者, E-mail: zhangweiwei_nefu@163.com;

第一作者介绍 刘涛,男,硕士研究生;研究方向:鸟类分类与系统发育研究,保护生物学; E-mail: lanzhige2010@163.com.

收稿日期: 2019-02-27, 修回日期: 2019-05-14 DOI: 10.13859/j.cjz.201905025