

宁夏中卫发现丝光椋鸟和红嘴巨燕鸥

Silky Starling and Caspian Tern Found in Zhongwei, Ningxia, China

2016年6月6日在宁夏回族自治区中卫市沙坡头区西南部一处旱田和果园附近(37°28'02" N, 105°02'45" E, 海拔1233 m)记录到丝光椋鸟(*Spodiopsar sericeus*)雄雌各1只。2017年6月29日于此地再次记录到2只。根据个体的站姿、体形和羽色等主要物种特征均可辨识。2018年至2020年在此地点及周边地区均未再次记录到该物种。根据文献(王香亭 1990, 郑光美 2017)确定丝光椋鸟为宁夏鸟类分布新记录种。

2020年6月28日,在中卫市沙坡头区小湖湿地(37°34'53.3" N, 105°07'24.5" E, 海拔1252 m),记录到鸥科一鸟类(图1)。其嘴长直,呈鲜红色,嘴基粗厚,嘴端暗色;前额、头顶和枕部黑色;眼先、耳羽以下头侧、颊、喉和整个下体白色;后颈、尾上覆羽和尾亦呈白色;尾呈叉状;背、肩和翼上覆羽银灰色。确认系红嘴巨燕鸥(*Hydroprogne caspia*)成体。2014至2019年同时段在小湖湿地均未记录到该物种。推测所记录个体为迁徙鸟或迷鸟。根据文献(王香亭 1990, 郑光美 2017)确认该物种系宁夏鸟类分布新记录种。



图1 在宁夏中卫市沙坡头区小湖湿地拍摄到的红嘴巨燕鸥(箭头示)

Fig. 1 A Caspian Tern *Hydroprogne caspia* were photographed at Xiaohu wetland in Shapotou District, Zhongwei City, Ningxia (indicated by the arrow)

丛培昊

兰州大学生命科学学院 兰州 730000

基金项目 生态环境部生物多样性保护专项;

作者介绍 丛培昊,男,副教授;研究方向:鸟类生态学;E-mail: congph@lzu.edu.cn。

收稿日期: 2020-11-22, 修回日期: 2021-04-27 DOI: 10.13859/j.cjz.202320293