

山东威海发现紫背椋鸟

Chestnut-Cheeked Starling *Agropsar philippensis* Found in Weihai, Shandong, China

2021年5月4日下午,在威海荣成市爱莲湾小区公园(122°35'31" E, 37°11'35" N, 海拔2 m)记录到紫背椋鸟(*Agropsar philippensis*)1只(图1),其羽毛自然完整,警觉性强,发现时被1只喜鹊追赶。近几年荣成市场调查未见有笼养紫背椋鸟情况,可认为是野生个体(徐亮 2017),确认为山东省鸟类分布新记录种(约翰·马敬能等 2000, 赛道建 2017, 郑光美 2017)。发现紫背椋鸟的公园位于山东半岛东端,紧靠黄海海岸,迁徙过境的鸟类众多,是朝鲜半岛与日本鸟类迁徙的重要途经地点。这也是目前已知的紫背椋鸟在我国最北端的分布记录。随着观鸟群体的扩大,将有助于明晰其在中国东部的分布。



图1 紫背椋鸟(李晓摄)

Fig. 1 Chestnut-cheeked Starling *Agropsar philippensis* (Photo by LI Xiao)

高晓冬^① 李晓^② 刘广帅^① 杨秀峰^① 张洪海^{①*}

① 曲阜师范大学生命科学学院 曲阜 273165; ② 中国建设银行股份有限公司威海分行 威海 264200

基金项目 国家自然科学基金项目(No. 31872242);

* 通讯作者, E-mail: zhanghonghai67@126.com;

第一作者介绍 高晓冬,男,博士;研究方向:水鸟生态学;E-mail: gao-xiaodong@163.com。

收稿日期: 2021-05-17, 修回日期: 2022-06-24 DOI: 10.13859/j.cjz.202321117 CSTR: 32109.14.cjz.21117