

黑龙江小兴安岭发现越冬的黄喉鹀和红尾斑鹀

Overwintering Yellow-Throated Bunting *Emberiza elegans* and Naumann's Thrush *Turdus naumanni* Found in Xiaoxing'anling Mountain, Heilongjiang, China

在黑龙江小兴安岭地区通河县开展野生动物资源调查期间，记录到越冬的黄喉鹀 (*Emberiza elegans*) (图 1a, b) 和红尾斑鹀 (*Turdus naumanni*) (图 1c, d)，是这两种鸟类在小兴安岭地区越冬的首次报道 (马建章等 1992, 常家传等 1995, 约翰·马敬能 2022, 郑光美 2023)。



图 1 黑龙江小兴安岭越冬鸟类新记录

Fig. 1 New records of overwintering birds in Xiaoxing'anling Mountain, Heilongjiang Province

a. 雌性黄喉鹀 (*Emberiza elegans*); b. 雄性黄喉鹀; c、d. 红尾斑鹀 (*Turdus naumanni*).
a. Female Yellow-throated Bunting; b. Male Yellow-throated Bunting; c, d. Naumann's Thrush.

基金项目 全国第二次陆生野生动物资源调查项目 (No. 2019072)，2021 年度黑龙江省高等教育教学改革研究一般研究项目 (No. SJGY20210468)；

* 通讯作者，E-mail: liupeng111111@163.com；

第一作者介绍 高智晟，女，副教授；研究方向：鸟类生态学；E-mail: zhishenggao@163.com。

收稿日期：2021-10-08，修回日期：2023-11-23 DOI: 10.13859/j.cjz.202421247 CSTR: 32109.14.cjz.21247

2021 年 1 月 13 日, 在黑龙江省通河县凤山镇 (46°13'06" N, 128°37'55" E) 拍摄到 3 只黄喉鹀。2021 年 1 月 14 日, 在通河县浓河镇 (46°05'52" N, 128°20'48" E) 拍摄到 6 只黄喉鹀与 5 只北朱雀 (*Carpodacus roseus*) 混群、6 只黄喉鹀与 3 只北朱雀混群、4 只黄喉鹀与 1 只普通鹀 (*Sitta europaea*) 混群; 同日, 在通河县富林乡 (46°02'47" N, 128°42'34" E) 拍摄到 4 只黄喉鹀与 1 只长尾雀 (*C. sibiricus*) 混群。2021 年 1 月 13 日, 在通河县祥顺镇 (46°04'37" N, 129°09'31" E) 拍摄到 1 只红尾斑鹀与 5 只太平鸟 (*Bombycilla garrulus*) 混群。

黑龙江省鸟类新记录的发现时间多为繁殖期和迁徙期 (邢晓莹等 2017), 因此建议进一步加强冬季鸟类物种多样性的调查力度, 鸟类冬季留居于北方的主要生态原因也需要进一步探讨 (刘伯文等 1992)。黄喉鹀和红尾斑鹀是黑龙江小兴安岭地区比较容易被观察和记录的夏候鸟和旅鸟, 其越冬个体的发现可为深入研究动物对环境变化的行为响应机制提供基础数据。

高智晟 刘志涛 于东 陈辉 彭一良 刘鹏* 赵文阁

哈尔滨师范大学生命科学与技术学院 哈尔滨 150025