中国鸟类分布新记录种——大黄脚鹬

A new bird record in China: Greater Yellowlegs (*Tringa melanoleuca*)

2026 年 8 月 16 日，在江苏省盐城市东台市蹲门村（32°58′58″ N，120°52′24″ E，海拔 2.11 m）水稻田中，观察到 1 只体型较大的鹬迎面飞来（图 1）。该鸟体型似青脚鹬（*Tringa nebularia*），脚为亮黄色，上体黑褐，密布白色斑点，头、颈、胸密布黑褐色纵纹；两胁具横斑，腹部白色，喙粗且上翘，基部呈黄绿色，腰、尾上覆羽洁白，尾羽具细密黑横斑。与青脚鹬相比，其胫、跗跖颜色呈亮黄色而非青绿色，腰部白色不上延至背，胁部有明显横斑；与小黄脚鹬（*T. flavipes*）相比，其体型更大，嘴粗长略上翘。根据 *A Field Guide to the Waterbirds of Asia*（Sonobe and Usui 1993）和 eBird 数据库（https://ebird.org/species/greyel），最终鉴定该物种为大黄脚鹬（*T. melanoleuca*）。该个体后于 2026 年 8 月 17 日傍晚及 2026 年 8 月 18 日全天多次被观察记录到，其与林鹬（*T. glareola*）、红脚鹬（*T. totanus*）、黑翅长脚鹬（*Himantopus himantopus*）、长趾滨鹬（*Calidris subminuta*）、矶鹬（*Actitis hypoleucos*）等一同在水沟边来回觅食（图 2）。查阅《中国鸟类观察手册》（刘阳和陈水华 2021）、《中国鸟类野外手册》（约翰·马敬能等 2022）、《中国鸟类分类与分布名录》（4 版，郑光美等 2023）和《中国观鸟年报-中国鸟类名录 12.0 版》（中国观鸟年报编辑 2024），大黄脚鹬均未被收录，故确认此次发现的大黄脚鹬为中国鸟类分布新记录种。

大黄脚鹬，是鸻形目（Charadriiformes）鹬科（Scolopacidae）鹬属（*Tringa*）鸟类，IUCN 保护等级为近危级（Near Threatened，NT）（Gill et al. 2026）。该物种繁殖于北美阿拉斯加南部和加拿大西南部至东拉布拉多的温带针叶林苔原。非繁殖季节分布于美国南部、中美洲、南美洲，包括加利福尼亚北部、宾夕法尼亚州，遍及加勒比海至火地岛，以及加拉帕戈斯群岛（Elphick and Tibbits 2022）。该种在日本和俄罗斯远东地区被列为罕见迷鸟，在东亚—澳大利西亚迁飞区范围内属于极罕见的跨洋扩散个体。近两年，大黄脚鹬在韩国的高敞郡（35°30′41″ N，126°29′55″ E；35°26′35″ N，126°26′06″ E）、日本的熊谷市（36°08′51″ N，139°23′32″ E）和金沢市（36°39′22″ N，136°41′50″ E）有零星记录（数据来源：https://ebird.org/species/greyel）。此次发现的该物种个体可能是受异常天气影响而出现在中国东部沿海地区的迷鸟。

基金项目 黄海湿地课题项目（No. HESDKT202409）和 2025 年中央财政林草生态保护恢复资金江苏省陆生野生动物资源监测项目；

第一作者介绍 王钰涵，女，硕士研究生；研究方向：鸟类生态学；E-mail：wangyh202608@163.com。

收稿日期：2026-08-19，修回日期：2026-09-16 DOI：10.13859/j.cjz.202626144 CSTR：32109.14.cjz.202626144

图 1　于 2026 年 8 月 16 日在江苏盐城东台市拍摄到的飞行中大黄脚鹬

Fig. 1　Greater Yellowlegs (*Tringa melanoleuca*) in flight, photographed in Dongtai, Yancheng, Jiangsu, China, on 16 August 2026

图 2　江苏盐城东台大黄脚鹬觅食地生境

Fig. 2　The feeding habitat of Greater Yellowlegs (*Tringa melanoleuca*) in Dongtai, Yancheng, China

图中显示觅食地生境及与大黄脚鹬（站，前）一同觅食的红脚鹬（站，中）、黑翅长脚鹬（站，后）、林鹬（飞，前）与长趾滨鹬（飞，后）。

The figure shows its feeding habitat with other Charadriiform birds: the Greater Yellowlegs (*Tringa melanoleuca*, standing in front), the Common Redshank (*T. totanus*, standing in the middle), the Black-winged Stilt (*Himantopus himantopus*, standing behind), the Wood Sandpiper (*T. glareola*, flying in front), and the Long-toed Stint (*Calidris subminuta*, flying behind).

王钰涵 [1]　**龚德文** [1]　**梅雪** [2]　**王鹏程** [1]　**常青** [1]

1 南京师范大学生命科学学院　南京　210023；2 南京嘉腾维新软件有限公司　南京　210000

WANG Yu-Han[1]　**GONG De-Wen**[1]　**MEI Xue**[2]　**WANG Peng-Cheng**[1]　**CHANG Qing**[1]

1 *School of Life Sciences, Nanjing Normal University, Nanjing*　210023; 2 *Nanjing Jia Teng Wei Xin Software Co., Ltd, Nanjing*　210000, *China*