

# 安徽黃山的鳥類初步調查<sup>1,2)</sup>

鄭作新 錢燕文

(中國科學院動物研究所)

黃山在安徽南部，為長江下游江南丘陵地區的主要山脈，最高峯達 1948 米，山勢奇峻，景色雄威秀麗，全山周圍約 200 余里，位於北緯 30°20′—29′，東經 118°20′—25′ 之間。

安徽鳥類的調查<sup>3)</sup>，前經 La Touche 氏 (1925—1934) 予以綜合報導，嗣後復由 Kolthoff (1932) 及 David and Glass (1951) 在該省內作過採集。至於黃山一帶的鳥類，常麟定 (1933) 曾著有報告，錄列 17 種，均於 9 月間採得。

此次採集自 9 月 15 日到達黃山，直至 11 月初旬始離皖南返回北京，歷時約二個月。初抵黃山時，我們先由山南的桃源村，環繞湯嶺關前往黃山西北部的焦村、雙溪鎮一帶，此區域為山麓沿溪的平原，所採的鳥類都是經常遇見的種類。然後沿山的北部（即后山），經二龍橋村登山而至松谷菴（海拔 700 米），由此續走

坡路十五里至獅子林 (1,682 米)，這一區域樹木茂密，鳥類亦盛。再由獅子林向南，下山經雲谷寺返抵桃源村。最後取道前山上坡經半山寺 (1,387 米) 至文殊院 (1,756 米)。文殊院在黃山寺院中地勢最高，四周奇峯林立，爽秀絕世。至此可以說黃山全境十之八九，都已粗略地涉獵到了（附圖）。

10 月下旬離開黃山，取道青陽縣，轉赴九華山。九華山為黃山丘陵向北伸出的一支，亦是皖南的一個勝地，採集工作人員在此稍事採集後，即轉往南京北返。


本文共研究標本 223 號，計 74 種。此外，還有 18 種雖未經採到標本，却曾遇見或聽到鳴聲。統共 92 種，分隸 14 目 35 科；就中 49 種為安徽省的首次記錄<sup>4)</sup>，占總數一半以上，而其中復有不少罕見的種別。所以此次採獵時間雖短，而所得的鳥類竟然達到此數，足示皖南地區鳥類的丰盛。

## I、鸛形目 Ciconiiformes<sup>5,6)</sup>

### (1) 鸞科 Ardeidae

\*1. 黑鸞 *Dupetor flavicollis flavicollis* (Latham)

黃山 (VIII)。嘴峯 63，附蹠 64，翼 170 (正在換羽中)，尾 (不全)。



- 1) 本文研究標本大部由唐瑞耿、江智華二同志採得；此外 9 號標本系蕪湖市立第一中學所贈，特此致謝。
- 2) 本調查系在 1954 年 11 月完成。由於僅在秋季進行，一直想在春季再作一次調查，使得有更完整的資料，但因其他任務關係，未能有機會重赴黃山。黃山為一很好的野外實習地點，特先將此稿發表，以供參考。
- 3) Chong, L. T. (常麟定): 1933. Notes on some birds of Honan and South Anhwei. *Sinensia* 7(4): 459—470. David, W. B., and B. P. Glass: 1951. Notes on eastern Chinese birds. *Auk* 68(1): 86—91. Kolthoff, K.: 1932. Studies on birds in the Chinese provinces of Kiangsu and Anhwei, 1921—1922. *Göteborg's Kungl. Vetensk. Vitterh. Samh. Handl.* 5 Följden, ser. B, 3: 1—190. La Touche, J. D. D.: 1925—34. A handbook of the birds of eastern China. 1: i—500, 1925—30; 2: i—566, 1931—34. Taylor and Francis, London.
- 4) 所列禽鳥凡在安徽省境內為新記錄者，均注以 \* 號。
- 5) 指採集期；羅馬數字指月份，阿拉伯數字指日期。
- 6) 量度：體重以克計，長度以毫米計。

## II、雁形目 Anseriformes

## (2) 鴨科 Anatidae

\*2. 斑背潛鴨 *Aythya marila* Linné 曾在九华山二圣殿遇見, 未采得标本。

\*3. 鶩 *Aix galericulata* (Linné) 由黃山赴青阳县途中, 曾見到一雄鳥。

## III、鷹形目 Falconiformes

## (3) 鷹科 Accipitridae

4. 鳶 *Milvus korschun lineatus* (Gray) 在黃山桃源村、九华山、二圣殿等处集翔空中。

## (4) 隼科 Falconidae

5. 紅隼 *Falco tinnunculus saturatus* (Blyth) 湯口 (X, 13)。嘴峯 15, 附蹠 44, 翼 242, 尾 175。

## IV、鴉形目 Galliformes

## (5) 雉科 Phasianidae

\*6. 鸚鵡 *Francolinus pintadeanus* (Scopoli) 在黃山桃源村听到鳴聲。

\*7. 竹鷄 *Bambusicola thoracica thoracica* (Temminck) 在黃山桃源村遇見。

8. 環頸雉 *Phasianus colchicus torquatus* Gmelin 栗丘坦 (IX, 25)。嘴峯 32.3, 附蹠 71, 翼 225, 尾 230 (正在換羽中)。

## V、秧鷄目 Ralliformes

## (6) 秧鷄科 Rallidae

\*9. 紅腳苦惡鳥 *Amaurornis akool coccineipes* (Slater) 黃山 (VIII)。嘴峯 28, 附蹠 50, 翼 125, 尾 60。

\*10. 苦惡鳥、白胸秧鷄 *Amaurornis phoenicurus chinensis* (Boddaert) 在黃山二龙桥見到。

## VI、鶻形目 Charadriiformes

## (7) 鶻科 Scolopacidae

\*11. 丘鶻 *Scolopax rusticola rusticola* Linné 湯口 (X, 14)。體重 161, 嘴峯 76, 附蹠 37, 翼 189, 尾 93。

## VII、鴿形目 Columbiformes

## (8) 鳩鴿科 Columbidae

12. 珠頸斑鳩 *Sreptopelia chinensis chinensis* (Scopoli) 陳村 (IX, 27)。體重 175.5, 嘴峯 16.4, 附蹠 25, 翼 155, 尾 152。

## VIII、鵲形目 Cuculiformes

## (9) 杜鵑科 Cuculidae

13. 鷹头杜鵑 *Cuculus sparveroides sparveroides* Vigors 黃山 (VIII)。嘴峯 26, 附蹠 26, 翼 219, 尾 198。

## IX、鴝形目 Strigiformes

## (10) 鴝鴞科 Strigidae

14. 領鴝鴞 *Glaucidium brodiei brodiei* (Burton) 在黃山听涛遇見此鴝。

\*15. 鵯 *Glaucidium cuculoides whiteleyi* (Blyth) 曾在焦村見到。

## X、夜鷹目 Caprimulgiformes

## (11) 夜鷹科 Caprimugidae

\*16. 夜鷹 *Caprimulgus indicus jota* Temminck et Schlegel 黃山 (VIII)。嘴峯 9.5, 附蹠 18, 翼 172 (不全), 尾 (不全)。

## XI、雨燕目 Apodiformes

## (12) 雨燕科 Apodidae

17. 針尾雨燕 *Hirundo-apus caudacutus caudacutus* (Latham) 在黃山云谷寺遇見。

## XII、佛法僧目 Coraciiformes

## (13) 翠鳥科 Alcedinidae

18. 冠魚狗 *Ceryle lugubris guttulata* Stejneger 在黃山二龙桥見到一鳥。

\*19. 翠鳥 *Alcedo atthis bengalensis* Gmelin 焦村 (VIII)。嘴峯 35, 附蹠 8.5, 翼 69, 尾 38。

\*20. 藍翡翠 *Halcyon pileata* (Boddaert) 焦村 (VIII)。嘴峯 59.5, 附蹠 16, 翼 130, 尾 75。

## (14) 佛法僧科 Cocraciidae

\*21. 三宝鳥 *Eurystomus orientalis abundus* Riley (幼鳥) 慈光寺 (IX, 17), 茅蓬 (IX, 21)。體重 179, 嘴峯 30, 附蹠 18.8—22.8, 翼 188—190, 尾 101—106。

## XIII、鸚形目 Piciformes

## (15) 鬚鴉科 Capitonidae

22. 大拟啄木 *Megalaima virens virens* (Boddaert) 听涛 (IX, 27)。體重 186, 咀峯 40, 附蹠 33, 翼 137, 尾 99。

## (16) 啄木鳥科 Picidae

23. 綠啄木鳥 *Picus canus sobrinus* Peters 双溪鎮 (IX, 27), 陳村 (IX, 27)。體重 ♂ 147.2, ♀ 150, 嘴峯 ♂ 36.5, ♀ 37, 附蹠 ♂ 28, ♀ 28, 翼 ♂ 137, ♀ 144, 尾 ♂ 106, ♀ 125。在慈光寺亦曾見到一對。

24. 斑啄木鳥 *Dendrocopos major mandarinus* (Malherbe) 双溪鎮 (IX, 27), 陳村 (IX, 27)。體重 ♂ 77.5, ♀ 78.5, 嘴峯 ♂ 31, ♀ 28.5, 附蹠 ♂ 22, ♀ 21, 翼 ♂ 132, ♀ 131, 尾 ♂ 86, ♀ 86。

25. 星头啄木鳥 *Dendrocopos canicapillus nagamichii* (La Touche) 双溪鎮 (IX, 27)。體重 ♂ 29—31.5, ♀ 30.2, 嘴峯 ♂ 18, ♀ 18, 附蹠 ♂ 17, ♀ 16, 翼 ♂ 99—100, ♀ 103, 尾 ♂ 65, ♀ 70。

## XIV、雀形目 Passeriformes

## (17) 燕科 Hirundinidae

\*26. 金腰燕 *Hirundo daurica japonica* Temminck et Schlegel 湯口 (IX, 20)。嘴峯 6.5, 附蹠 13.3, 翼 111, 尾 78。

(18) 鵲鴝科 Motacillidae

\*27 树鵲 *Anthus hodgsoni yunnanensis* Uchida et Kuroda 焦村 (IX,30)、獅子林 (X,10)、二圣殿 (X,27)。嘴峯 11—12, 跗蹠 20.6—22, 翼 80—86, 尾 61—69。自山麓以至山頂均有,但不常見。

\*28.灰鵲鴝 *Motacilla cinerea melanope* Pallas 湯口 (IX,21—X,13) 焦村 (IX,27)、獅子林 (X,10)。体重 15.4—18.8, 咀峯 12.8—14, 跗蹠 18—19.5, 翼 77—84, 尾 90—96。

\*29.白鵲鴝 *Motacilla alba leucopsis* Gould 焦村 (IX,26)。体重 18.8—23.2, 嘴峯 13.5—15, 跗蹠 21.5—23.4, 翼 81—90, 尾 87—94。

(19) 山椒鳥科 Campephagidae

30.粉紅山椒鳥 *Pericrocotus roseus cantonensis* Swinhoe 北塢 (IX,28)。体重 20.5, 嘴峯 12.4—13, 跗蹠 15, 翼 88—89, 尾 96—100。

(20) 鶇科 Pycnonotidae

31.黑[短脚]鶇 *Microscelis leucocephalus leucocephalus* (Gmelin) 北塢 (IX,28)、慈光寺 (X,17—18)、茅蓬 (X,19)。体重 54.5—56, 嘴峯 21.3—24.4, 跗蹠 18.2—19.8, 翼 116—121, 尾 99—107。在獅子林、云谷寺亦會遇見。常成羣栖止于高大的乔木上。

32.白头鶇 *Pycnonotus sinensis sinensis* (Gmelin) 双溪鎮 (IX,26)、逍遙亭 (X,13)。体重 29.7—37, 嘴峯 14.8—15, 跗蹠 21—22.6, 翼 84, 尾 77 (在換羽中)。

33.綠鸚嘴鶇 *Spizixos semitorques semitorques* Swinhoe 虎頭岩 (IX,25)、貫下 (IX,27)、甘露寺 (X,27)。体重 37.5—40.7, 嘴峯 12—14, 跗蹠 20.3—21.4, 翼 80—89, 尾 76—98。

(21) 伯勞科 Laniidae

34.紅尾伯勞 *Lanius cristatus lucionensis* Linné 北塢 (IX,28)。体重 34.7, 嘴峯 15—16, 跗蹠 25, 翼 85, 尾 83。

(22) 黃鸝科 Oriolidae

35.黑枕黃鸝 *Oriolus chinensis diffusus* Sharpe 此鳥于 9 月間在双溪鎮見到。

(23) 捲尾科 Dicruridae

36.髮冠捲尾 *Dicrurus hottentottus brevirostris* (Cabanis et Heine) 慈光寺 (IX,18)。体重 87.7—103.5, 嘴峯 305—33, 跗蹠 24.5—26, 翼 162—164, 尾 133—143。

(24) 椋鳥科 Sturnidae

37.灰椋鳥 *Sturnus cineraceus* Temminck 青阳 (X,21)。嘴峯 24, 跗蹠 31.5, 翼 129, 尾 69。

38.八哥 *Acridotheres cristatellus cristatellus* (Linné) 會在青阳县見到。

(25) 鶇科 Corvidae

39.松鴉 *Garrulus glandarius* subsp. 會在獅子林 (1682 米) 見到此鳥。依松鴉目前所知的分布情況而言,当系 *Sinensis* Swinhoe。

40.紅嘴藍鶇 *Kitta erythrorhyncha erythrorhyncha* (Boddaert) 茅蓬 (IX,16—X,18)。体重 152.5—172, 嘴峯♂33.4—35.8, ♀31.4—31.8, 跗蹠♂44—44.5, ♀42.4—44, 翼♂180—187, ♀172—173, 尾♂308—337, ♀353—370。

41.喜鶇 *Pica pica sericea* Gould 焦村 (IX,25)、九华山 (X,25)。嘴峯 34, 跗蹠♂50.8, ♀50, 翼♂206, ♀200, 尾♂249, ♀230。

42.灰樹鶇 *Crypsirina formosae sinica* (Stresemann) 湯口 (IX,16)。嘴峯 29.5, 跗蹠 29, 翼 139, 尾 188。

43.大嘴烏鶇 *Corvus macrorhyncha colonorum* Swinhoe 會在焦村遇見。

44.秃鼻烏鶇 *Corvus frugilegus pastinator* Gould 常見于焦村一帶。

45.白頸鶇 *Corvus torquatus* Lesson 焦村 (IX,25)、九华山 (X,25)。嘴峯 49—56, 跗蹠 55—66, 翼 310—343, 尾 189—208。

(26) 河鳥科 Cinclidae

46.褐河鳥 *Cinclus pallasii pallasii* Temminck 茅蓬 (IX,16—19)、二圣殿 (X,27)。嘴峯♂24, ♀25—26, 跗蹠♂29.5—30, ♀30—31, 翼♂97—111, ♀102—106, 尾♂61—72, ♀60—66。自半山寺以至山麓的溪流中均遇見此鳥。

(27) 鶇科 Muscicapidae

(i) 鶇亞科 Turdinae

47.小燕尾 *Enicurus scouleri* Vigors 湯口 (IX,19)、茅蓬 (IX,20)。嘴峯 11.5—12, 跗蹠 24—24.5, 翼 76—78, 尾 53—54。地勢較高的山溪未曾見到。

48.黑背燕尾 *Enicurus leschenaulti sinensis* Gould 湯口、焦村、松谷菴、茅蓬、九华村 (IX,20—X,27)。体重 41—47.2, 嘴峯♂24—25, ♀23.5—25, 跗蹠♂31—33, ♀31—32, 翼♂110—113, ♀104—108, 尾♂158—170, ♀144—161。

49.紅脇藍尾鶇 *Tarsiger cyanurus cyanurus* (Pallas) 九华村 (X,27)。嘴峯 9, 跗蹠 22, 翼 77, 尾 58。

50.北紅尾鶇 *Phoenicurus aureus* (Pallas) 二圣殿 (X,27)。嘴峯 12, 跗蹠 23, 翼 73, 尾 64。

51.紅尾溪鶇 *Chaimarrornis fuliginosus fuliginosus*

(Vigors) 湯口、獅子林、茅蓬 (IX, 16—X, 13)。体重 21.5—23.5, 嘴峯 ♂11—11.5, ♀10.5—11.5, 跗蹠 ♂23—25, ♀22—24, 翼 ♂73—74, ♀69—70, 尾 ♂54—60, ♀45—52。

52. 白喉磯鶇 *Monticola gularis* (Swinhoe) 湯口 (X, 18)。体重 33, 嘴峯 17, 跗蹠 23, 翼 93, 尾 62。

53. 藍磯鶇 *Monticola solitaria philippensis* (Muller) 湯口 (X, 16)。嘴峯 22, 跗蹠 29, 翼 118, 尾 79。

54. 紫嘯鶇 *Myophonus caeruleus caeruleus* (Scopoli) 見于桃源村。

55. 烏鶇 *Turdus merula mandarinus* Bonaparte 黃山 (VIII)。嘴峯 26, 跗蹠 35.4, 翼 144, 尾 (不全)。

(ii) 画眉亞科 *Timaliinae*

56. 棕頭鈎嘴鶇 *Pomatorhinus ruficollis styani* Seebohm 焦村 (IX, 30)、松谷菴 (X, 4)、云谷寺 (X, 12)、茅蓬 (X, 15)。体重 26.5—28.3, 嘴峯 17—20, 跗蹠 27—28.5, 翼 68—77, 尾 75—84。

57. 銹臉鈎嘴鶇 *Pomatorhinus erythrogegens swinhoei* David 茅蓬 (IX, 24)。体重 82, 嘴峯 33, 跗蹠 38, 翼 102.5, 尾 104。

58. 小鷓鴣 *Pnoepyga pusilla pusilla* Hodgson 松谷菴 (X, 4)、半山寺 (X, 15)。体重 11.5, 嘴峯 10.2, 跗蹠 18.4, 翼 47—48, 尾 15。

59. 紅頭穗鶇 *Stachyris davidi davidi* (Oustalet) 茅蓬 (X, 18)。体重 9.5, 嘴峯 (不全), 跗蹠 17.5, 翼 53, 尾 50。

60. 棕頭鴉雀 *Paradoxornis webbiana suffusus* (Swinhoe) 焦村 (IX, 26)、逍遙亭 (X, 13)。嘴峯 ♂9.2, ♀7.8—8, 跗蹠 ♂18.6, ♀18.6—19, 翼 ♂47.2, ♀48—49, 尾 ♀54 (在換羽中)。

61. 黑臉噪鶇 *Garrulax perspicillatus perspicillatus* (Gmelin) 雙溪鎮 (IX, 26)、陳村 (IX, 27)、湯口 (X, 13)。体重 116.5—138.5, 嘴峯 24—26, 跗蹠 41—44.5, 翼 120—123, 尾 136—152。

62. 灰翅噪鶇 *Garrulax cineraceus cinereiceps* (Styan) 茅蓬、慈光寺、二龍橋 (IX, 17—X, 19)。体重 ♂44—52, ♀43.8—46.2, 嘴峯 ♂19—22, ♀18.7—21.5, 跗蹠 ♂29.5—34, ♀30.2—34, 翼 ♂80—90, ♀84—90, 尾 ♂92—105, ♀99—108。

63. 棕噪鶇 *Garrulax pocillorhynchus berthemyi* (David et Oustalet) 松谷菴 (X, 4)、獅子林 (X, 7)、云谷寺 (X, 12)。嘴峯 22—23, 跗蹠 42.5, 翼 118—123, 尾 125—133。

64. 画眉 *Garrulax canorus canorus* (Linné) 茅蓬 (X, 19)、九華村 (X, 25—26)。此鳥善鳴, 山中到

處常听到其鳴聲。

65. 紅嘴相思鳥 *Leiothrix lutea lutea* (Scopoli) 文殊院 (IX, 18)、茅蓬 (IX, 25)、獅子林 (X, 8—10)、逍遙亭 (X, 13)。体重 22—25.8, 嘴峯 12—13.5, 跗蹠 24—25, 翼 62—71, 尾 54—62。

66. 白眶雀鶇 *Alcippe morrisonia hueti* David 松谷菴 (X, 2)、茅蓬 (X, 12)、逍遙亭 (X, 13)、立馬亭 (X, 16)。体重 15.8—17.5, 嘴峯 11.5—12.9, 跗蹠 22, 翼 63—67, 尾 59—62。

67. 褐雀鶇 *Alcippe brunnea superciliaris* (David) 松谷菴 (X, 3)、慈光寺 (X, 19)。嘴峯 12—13, 跗蹠 23, 翼 59—63, 尾 55—60。

(iii) 鶇亞科 *Sylviinae*

68. 棕腹柳鶇 *Phylloscopus subaffinis* Ogilvie-Grant 獅子林 (X, 9)。嘴峯 11, 跗蹠 18.5, 翼 53, 尾 48—49。

69. 黃眉柳鶇 *Phylloscopus inornatus inornatus* (Blyth) 焦村 (IX, 25—30)、獅子林 (X, 9—10)、茅蓬、九華村 (X, 25)。体重 6—6.3, 嘴峯 8—9, 跗蹠 15.9—17.6, 翼 52—56, 尾 35—43。

70. 黃腰柳鶇 *Phylloscopus proregulus proregulus* (Pallas) 九華村 (X, 25)。嘴峯 7.5, 跗蹠 15.9, 翼 49.5, 尾 39。

71. 極北柳鶇 *Phylloscopus borealis borealis* (Blasius) 雙溪鎮 (IX, 26)。体重 9.8, 嘴峯 11, 跗蹠 19.2, 翼 65, 尾 49。

72. 冠紋柳鶇 *Phylloscopus reguloides fokienensis* Hartert 茅蓬 (IX, 17)、松谷菴 (X, 4)。体重 8.1, 嘴峯 11.5, 跗蹠 15.9—16.5, 翼 60—61, 尾 45—48。

73. 棕臉鶇 *Seicercus albogularis fulvifacies* (Swinhoe) 茅蓬 (X, 18)。体重 5, 嘴峯 7, 跗蹠 16, 翼 45.5, 尾 70。

74. 紋背山鷓鶇 *Prinia criniger parumstriata* (David et Oustalet) 湯口 (IX, 21)、焦村 (IX, 30)、二龍橋 (X, 1)。体重 10.2—11.5, 嘴峯 10—11, 跗蹠 19—20.5, 翼 45—49, 尾 70—76 (不全)。

(iv) 鶇亞科 *Muscicapinae*

75. 白腹藍鶇 *Ficedula cyanomelana cumatilis* (Thayer et Bangs) 茅蓬 (IX, 24—X, 19)、白云菴 (IX, 25)、慈光寺 (X, 16)。体重 18—25.5, 嘴峯 10—11, 跗蹠 16—16.5, 翼 89—97, 尾 60—70。

76. 紅喉鶇 *Ficedula parva albicilla* (Pallas) 雙溪鎮 (IX, 27)。体重 12.5, 嘴峯 9.5, 跗蹠 17.5, 翼 69, 尾 52。

77. 鶇鶇 *Ficedula mugimaki* (Pallas) 松谷菴 (X,

2)、獅子林(X,11)、慈光寺(X,15)、茅蓬(X,19)、二圣殿(X,27)。嘴峯 8.5—9, 附跖 16, 翼 68—73, 尾 48—53。

78. 北灰鷓 *Muscicapa davurica davurica* Pallas  
焦村(IX,30)、二龙桥(X,1)。体重 8.5—11.2, 嘴峯 10.5, 附跖 11.7—13.9, 翼 68—70, 尾 49—51。

79. 烏鷓 *Muscicapa sibirica sibirica* Gmelin 松谷菴(X,4)。嘴峯 9.5, 附跖 13, 翼 75, 尾(不全)。

(28) 山雀科 Paridae

80. 大山雀 *Parus major commixtus* Swinhoe 貫下(IX,27)、双溪鎮(IX,27—29)、湯口(X,13)、文殊院(X,15)、茅蓬(X,16)、二圣殿(X,27)。体重 13.2—14.7, 嘴峯 ♂ 9—10、♀ 9, 附跖 ♂ 18—19、♀ 18, 翼 ♂ 66—69、♀ 67, 尾 ♂ 61—65、♀ 67。

81. 煤山雀 *Parus ater kuatunensis* La Touche  
獅子林(X,8—11)。嘴峯 8.5—9, 附跖 15, 翼 57—58, 尾 41。

82. 銀喉[长尾]山雀 *Aegithalos caudatus glaucularis* (Moore) 双溪鎮(IX,26)。体重 7, 嘴峯 7, 附跖 16, 翼 53, 尾 62。

83. 紅头[长尾]山雀 *Aegithalos concinnus concinnus* (Gould) 栗丘坦(IX,25)、茅蓬(X,12—19)。体重 6, 嘴峯 6—7, 附跖 14.8—15.5, 翼 48—50.4, 尾 50—56。

(29) 繡眼科 Zosteropidae

84. 暗綠繡眼鳥 *Zosterops japonica simplex* Swinhoe  
獅子林(X,9)。嘴峯 10, 附跖 15, 翼 55, 尾 42。

(30) 文鳥科 Ploceidae

85. 麻雀 *Passer montanus saturatus* Stejneger  
湯口(IX,20)、九华村(X,27)。嘴峯 10—12, 附跖 17—18, 翼 60—68, 尾 45—52。

\*86. 白腰文鳥 *Lonchura striata swinhoi* (Cabanis)  
北塢(IX,28)。体重 12.2—13.2, 嘴峯 ♂ 10.5、♀ 10, 附跖 ♂ 13.5、♀ 13, 翼 ♂ 51.2、♀ 50, 尾 ♂ 42、♀ 42。

87. 斑文鳥 *Lonchura punctulata topela* (Swinhoe)  
逍遙亭(X,13)。体重 13, 嘴峯 11.5, 附跖 14.7, 翼 54, 尾 40。

(31) 雀科 Fringillidae

\*88. 小鷓 *Emberiza pusilla* Pallas 九华村(X,25)。嘴峯 8.5—9, 附跖 17.4—18.4, 翼 69—70, 尾 60—61。

\*89. 黃眉鷓 *Emberiza chrysophrys* Pallas 双溪鎮(IX,26)。体重 19, 嘴峯 11.5, 附跖 20, 翼 77, 尾 67。

\*90. 灰头鷓 *Emberiza spodocephala spodocephala* Pallas 九华村(X,25)。嘴峯 10.9, 附跖 19, 翼 71, 尾 66。

\*91. 黃胸鷓 *Emberiza aureola aureola* Pallas 獅子林(X,8)。嘴峯 11.9, 附跖 19, 翼 76, 尾 63。

\*92. 藍鷓 *Emberiza siemseni* (Martens) 獅子林(X,9)、慈光寺(X,15)。体重 16, 嘴峯 ♂ 9、♀ 10, 附跖 18, 翼 ♂ 67、♀ 65—66, 尾 ♂ 56、♀ 55。

上面所列的鳥類中, 在垂直分布方面, 曾在 1000 米以上見到的有樹鷓、灰鷓、紅尾溪鷓、鈎嘴鷓、小鷓、棕噪鷓、紅嘴相思鳥、白眶雀鷓、棕腹柳鶯、黃眉柳鶯、鷓、大山雀、煤山雀、暗綠綉眼鳥、黃胸鷓和藍鷓等。栖处仅限于 1000 米以上山区者有小鷓、棕腹柳鶯、煤山雀、藍鷓等, 而在此比較常見的種類當推鈎嘴鷓、棕噪鷓、紅嘴相思鳥等。

在地理分布方面, 許多南方的典型種類均分布至此。這些種類是鷓、鷓、鷓、大拟啄木、黑鷓、白头鷓、綠鸚嘴鷓、八哥、灰樹鷓、黑背燕尾、小燕尾、烏鷓、棕头鈎嘴鷓、銹臉鈎嘴鷓、小鷓、紅头穗鷓、灰翅噪鷓、棕噪鷓、画眉、紅嘴相思鳥、褐雀鷓、白眶雀鷓、棕腹柳鶯、棕臉鷓、紋背山鷓、紅头山雀、白腰文鳥、斑文鳥等。就現有的資料來看, 這些鳥類自秦嶺以東的分布, 顯然以黃山為江南這一地段最北的界限了。似這樣的分布現象涉及東洋界與古北界自秦嶺以東的劃界問題, 值得日後進一步的研究。