

河北省北部常見鳥類的野外鑑別*

鄭光美
(北京師範大學生物系)

根據鳥類的外形、棲止和飛翔的特点來確認種類，是研究鳥類生態和地理分布的基礎。對於開展羣眾性的動物資源調查及領導大、中學生進行動物學野外實習和自然界觀察來說，更具有重要意義。然而，在我國除了鄭作新先生提出的“根據羽色來辨別種類***”外，其他的材料還很少。因此，本文擬就河北省北部的常見種類，依據其棲居環境和生態羣加以鑑別，希望能夠對開始從事野外工作的同志有所幫助。在一定程度上也可作為鑑別我國北方鳥類的參考。

根據記載，本省能遇到的鳥類約四百種左右，其中大多數屬稀有種。我們都知道，只有那些在數量上占優勢並一般分布較廣泛的種類和人的利害關係最為密切，這些才是最容易遇到的。因此，我們就着重討論這些鳥類。少數如猛禽、鶲等，雖屬稀有種但分布較廣泛，又系大型鳥類，引人注意，因而亦略加敘述。文內所列舉的特徵，大多在野外可見，極少數如鴨類由於不易區分，輔以分類特徵以供參考。文章所依據的材料是在北京近郊、百花山、金山、上方山、通縣、密雲、昌黎、安國、寶坻以及靜海、勝芳水面的野外觀察和采集的紀錄，並參考了作者在內蒙東部、東北中南部的鳥類數量統計資料。

河北省北部常見鳥類的目錄

鶲形目 Colymbiformes

鶲科 Colymbidae

小鶲 鶲 *Colymbus ruficollis*

赤頸鶲 鶲 *Colymbus griseogenus*

鶴形目 Pelecaniformes

鶴鶲科 Phalacrocoracidae

鶲 鶲 *Phalacrocorax carbo*

鶲形目 Ciconiiformes

鶲科 Ardeidae

蒼鷺 *Ardea cinerea*

夜鷺 *Nycticorax nycticorax*

麻鳽 *Botaurus stellaris*

黃斑葦鳽 *Ixobrychus sinensis*

鶲科 Ciconiidae

黑鶲 *Ciconia nigra*

雁形目 Anseriformes

鴨科 Anatidae

小天鵝 *Cygnus bewickii*

豆雁 *Anser fabalis*

冠鴨 *Tadorna tadorna*

綠頭鴨 *Anas platyrhynchos*

斑嘴鴨 *Anas poecilorhyncha*

花臉鴨 *Anas formosa*

巴鴨 *Anas crecca*

羅紋鴨 *Anas falcata*

針尾鴨 *Anas acuta*

青頭潛鴨 *Aythya baeri*

紅頭潛鴨 *Aythya ferina*

斑頭秋沙鴨 *Mergus albellus*

秋沙鴨 *Mergus merganser*

隼形目 Falconiformes

鷹科 Accipitridae

雀鷹 *Accipiter nisus*

鵟鷂 *Circus melanoleucus*

白尾鷂 *Circus cyaneus*

鷹 *Mirvus korschun*

鷲 *Buteo buteo*

隼科 Falconidae

紅腳隼 *Falco vespertinus*

黃爪隼 *Falco naumannii*

紅隼 *Falco tinnunculus*

鴉形目 Galliformes

雉科 Phasianidae

雉 *Phasianus colchicus*

斑翅 *Perdix daurica*

石鴉 *Alectoris graeca*

鶴形目 Gruiformes

鶴科 Gruidae

灰鶴 *Grus grus*

秧鴨目 Ralliformes

秧鴨科 Rallidae

白骨頂 *Fulica atra*

* 写作中承鄭作新教授數次審閱文稿，提出寶貴意見；給予很大幫助和鼓勵，謹致衷心的感謝。

** 中國的鳥類，1952，p. 138；

鳥類野外工作手冊，1959，p. 8。

- 黑水鸡 *Gallinula chloropus*
- 鹤形目 Charadriiformes
- 水雉科 Jacanidae
- 水雉 *Hydrophasianus chirurgus*
- 鹬科 Charadriidae
- 金眶鹬 *Charadrius dubius*
- 鹬科 Scolopacidae
- 白腰杓鹬 *Numenius arquata*
- 扇尾沙锥 *Capella gallinago*
- 林鹬 *Tringa glareola*
- 白腰草鹬 *Tringa ochropus*
- 矶鹬 *Tringa nebipoleucus*
- 鸥形目 Lariformes
- 鸥科 Laridae
- 黑尾鸥 *Larus crassirostris*
- 银鸥 *Larus argentatus*
- 红嘴鸥 *Larus ridibundus*
- 白翅浮鸥 *Chlidonias leucoptera*
- 白额燕鸥 *Sterna albifrons*
- 燕鸥 *Sterna hirundo*
- 鸽形目 Columbiformes
- 鸠鸽科 Columbidae
- 山斑鸠 *Streptopelia orientalis*
- 灰斑鸠 *Streptopelia decaocto*
- 火斑鸠 *Oenopelia trinquebarica*
- 岩鸽 *Columba rupestris*
- 鶲形目 Cuculiformes
- 杜鹃科 Cuculidae
- 大杜鹃 *Cuculus canorus*
- 四声杜鹃 *Cuculus micropterus*
- 雨燕目 Apodiformes
- 雨燕科 Apodidae
- 北京雨燕 *Apus apus*
- 佛法僧目 Coraciiformes
- 翠鸟科 Alcedonidae
- 翠鸟 *Alcedo atthis*
- 戴胜科 Upupidae
- 戴胜 *Upupa epops*
- 䴕形目 Piciformes
- 啄木鸟科 Picidae
- 綠啄木鸟 *Picus canus*
- 斑啄木鸟 *Dendrocopos major*
- 棕腹啄木鸟 *Dendrocopos hyperythrus*
- 星头啄木鸟 *Dendrocopos canicapillus*
- 雀形目 Passeriformes
- 百灵科 Alaudidae
- 凤头百灵 *Galerida cristata*
- 云雀 *Alauda arvensis*

- 燕科 Hirundinidae
- 家燕 *Hirundo rustica*
- 赤腰燕 *Hirundo daurica*
- 灰砂燕 *Riparia riparia*
- 鵙鵙科 Motacillidae
- 田鹨 *Anthus richardi*
- 树鹨 *Anthus hodgsoni*
- 水鹨 *Anthus spinolella*
- 白脸鶲鵙 *Motacilla alba*
- 黄鶲鵙 *Motacilla flava*
- 山鶲鵙 *Dendronanthus indicus*
- 太平鸟科 Bombycillidae
- 太平鸟 *Bombycilla garrulus*
- 伯劳科 Laniidae
- 红尾伯劳 *Lanius cristatus*
- 黄鹂科 Oriolidae
- 黄鹂 *Oriolus chinensis*
- 捲尾科 Dicruridae
- 黑捲尾 *Dicrurus macrocercus*
- 椋鸟科 Sturnidae
- 灰椋鸟 *Sturnus cineraceus*
- 鶲科 Corvidae
- 喜鹊 *Pica pica*
- 灰喜鹊 *Cyanopica cyana*
- 红嘴蓝鹊 *Kitta erythrorhyncha*
- 秃鼻乌鸦 *Corvus frugilegus*
- 乌鸦 *Corvus corone*
- 寒鸦 *Corvus monedula*
- 白颈乌鸦 *Corvus torquatus*
- 红嘴山鸦 *Coracia pyrrhocorax*
- 鶲科 Turdinae
- 红尾鶲 *Turdus naumanii*
- 蓝尾鶲 *Tarsiger cyanurus*
- 莺科 Sylvidae
- 大葦鶯 *Acrocephalus arundinaceus*
- 黃眉柳莺 *Phylloscopus inornatus*
- 黃腰柳莺 *Phylloscopus proregulus*
- 鶲科 Muscicapidae
- 灰鶲 *Muscicapa daurica*
- 烏鶲 *Muscicapa sibirica*
- 黃喉鶲 *Muscicapa parva*
- 山雀科 Paridae
- 大山雀 *Parus major*
- 沼澤山雀 *Parus palustris*
- 文鸟科 Placeidae
- 麻雀 *Passer montanus*
- 雀科 Fringillidae
- 燕雀 *Fringilla montifringilla*

- 金翅 *Carduelis sinica*
 朱雀 *Carpodacus erythrinus*
 錫嘴 *Coccothraustes coccothraustes*
 灰头鶲 *Emberiza spodocephala*
 小鶲 *Emberiza pusilla*
 黄胸鶲 *Emberiza aureola*
 董鶲 *Emberiza pallasi*
 白头鶲 *Emberiza leucocephala*
 三道眉草鶲 *Emberiza cioides*
 灰眉岩鶲 *Emberiza cia*

一、水域鳥类

本地区包括河流、洼淀、水庫及大面水田等地，主要鳥类有如下述：

1. 游禽，主要在水中游泳取食，腿短而具蹼，尾短，尾脂腺发达，羽毛紧密（图1）……… 2

涉禽，主要栖于浅水、沼澤地及岸边地面上，具加长的喙、足和頸，趾細长以便在泥泞中行走（图4、5）……… 8

2. 体純白色，似鵝，游泳时长頸直向上伸与水面垂直；嘴基黃色較相近种少………小天鵝
体多純黑色……… 3

体非純白或純黑色……… 5

3. 鴨形，游泳时身体大部露出水面，頸部前傾并伴以規律的伸縮动作……… 4

具長而尖的鈎嘴，腿极靠后，因而栖止时有如直立；游泳时身体大部浸于水中……… 鶲鷺（图2）

4. 頸甲白色………白骨頂
頸甲紅色………黑水鷉

5. 鷓形，多灰白色，翅尖、善作持续性飞行，常在离水面不高处翻翔，双翅揚动較慢；游泳时尾端翹起，长翅伸达尾之后上方（图1）……… 鷓類

鷓形，很少灰白色；作直線飞行，頸直伸，揚翅急促；在陸上步行笨拙，左右搖摆……… 6

6. 喙多扁平似鴨，雄者羽色多鮮艳，多具翼鏡；春秋常結成百十只之大羣，叫声“嘎嘎”；游泳时尾明显可見。遇敌时突然起飞，作长距离快速飛翔，揚翅声甚大，飞时脚不显……… 7

喙尖錐狀，体多褐色，不具翼鏡，常結成小羣，叫声如水笛；游泳时几不見尾，遇敌时常借潛水逃避，間或貼水面作短距离飛翔，飞时双脚直伸于尾后极明显（图3）……… 鷓鷗類

7. 体較大、腿較长；多为暗褐色，不具翼鏡，嘴基部甚厚；游泳时尾常上翹似天鵝，迁徙时列队成八或一形，揚翅較慢。与相近种的区别为黑嘴，嘴尖具橙黃色斑；嘴較头短………豆雁

体較前者小、腿短；雄者顏色多鮮艳，多具翼鏡，嘴基部較扁平，游泳时身体与水面平行，迁徙时队形不定，揚翅較急……… 野鴨類

8. 体大、中型，具显著加长的腿与頸；栖止稳重，很少奔跑；常結小队飞行，双翅揚动慢而安祥……… 9

体中、小型，多为灰色或沙土色，腿頸皆較前者短；常作快速奔跑，遇敌时則停立不动，借保护色迷惑敌人；常結成大羣，飛翔快速，且为突然起飞、方向不定；飞时翅角明显，并伴以“滴利”之叫声（图4）……… 10

9. 栖止及飛翔时頸基部皆具显著的S状弯曲，双翅揚动极柔軟（图5）……… 鷺类

栖止时頸基部S状弯曲不显，飛翔时頸直伸，双翅揚动堅強如板状，体暗色（图5）……… 灰鵠、黑鵠

10. 体形似雉，为黑白二色，趾特长……… 水雉
体形似燕，尾分叉，基部白色……… 燕鵠（图6）

体形似鶲……… 11

11. 眼极度后移，头頂具黑縱紋（图7）；尾羽14枚……… 扇尾沙錐
眼正常……… 12

12. 喙短而直、末端膨大；体如鶲大，背褐腹白，頸部有黑环，眼圈鮮黃色……… 金眶鵠（图8）

喙細長、末端纖細……… 13

13. 体大型、褐色，喙特長而下弯，腰白色……… 白腰杓鶲
体中型，背灰褐色，腹白；喙直但較腿短……… 14

14. 尾根白色（图9）……… 林鵠，白腰草鵠
尾根不白，飞时翅上具明显白带（图10）……… 磯鵠

鷗类常見有鷗、燕鷗及浮鷗三类；浮鷗与燕鷗酷似，唯尾叉特浅。鷗与燕鷗的区别如下（图11）：

	体型	栖止	飛翔
鷗	体大，翅寬大，尾楔形	稳重，常栖于一处很久不动	揚翅慢而稳重
燕鷗	体小，翅狹長似燕，尾叉形	活动性强	揚翅快而灵活

常見种类有：

黑尾鷗 体較大、灰色、脚嘴黃色，尾端具黑寬紋。

紅嘴鷗 背灰腹白，成体繁殖期具显著的灰褐头，嘴腿紅色，叫声如人笑；尾白，但幼体具黑色尖端，在鑑別时应注意。

銀鷗 背灰腹白，黃嘴紅腿。

白翅浮鷗 雄鳥除翅緣及尾羽白色外，余均純黑。过去記載为本省旅鳥，但我們于7月間在各大水面皆見有大羣，杂有幼鳥；在蔚县并曾采获其卵。

白額燕鷗 体灰尾白，具黑头白額。

燕鷗 似上种但头全黑，尾叉深，嘴暗紅色。

鷓鷗类常見者有二种：体大頸長，背灰褐色，頸腹下方皆白色者为赤頸鷄鷗；体小型，前頸及脸部栗紫色者为小鷄鷗。

野鷗主要見于春秋季，数量較多者有：

綠头鷗 雄鷗头頸綠色、頸下具白环，翼鏡藍紫色，尾緣之白羽飞时清晰可見（图12）。

斑嘴鷗 雌雄同为土棕色，黑嘴之尖端具明显黃

斑，翼镜紫色；飞翔时翅前下缘白色可作为鉴别标志（图13）。过去有关此鸟在北方繁殖的记录尚少，我们曾在吉林省陶賴昭、飲馬河及河北省黃庄洼等地采获其卵。

冠鴨 具独特的黑白二色。极易识别（图14）。

花脸鴨 体棕色，胸前散有黑色珍珠状斑，雄者脸侧具鲜明的黑、黄、绿三色羽（图15）。此鸟为本地狩猎鸭中之主要对象。

巴鴨 体最小，褐色、棕头，雄鴨从眼到后颈有紫绿色宽纹，纹缘白色；翼镜绿色。

罗纹鴨 雄鴨具棕头、绿脸；背及胸部有灰白相间的鳞状纹，三级羽延长成镰刀状极显著。

针尾鴨 体暗灰色，颈背具黑线与黑头脸相连，腹白色；具长尖的黑尾羽极易识别（图16）。

野鴨除以上各种外还常见有潛鴨；在野外可注意以下数点特征：①体多暗色、头大颈短；②翼镜多不显；③主要靠长时间潛水取食；④游泳时尾端多下倾。本地秋冬间常见者二种，体头全黑，尾下白色者为青头潛鴨；头颈棕黄色者为红头潛鴨。

秋沙鴨为鴨类中仅有之具钩嘴者（图1），秋冬间数量较多，其头、颈、体发白色者为斑头秋沙鴨；黑绿色头颈者为秋沙鴨。

鶲类常见者有：

蒼鶲 大型，灰色。

夜鶲 头背黑绿色，常结小群蹲在树上，头颈极度弯曲；夜行性，叫声为“洼一”。我们曾见其攻击秃鼻烏鵰的巢群，双方争夺达数日之久。

麻鳽 中型，土黄色具暗褐色纵纹；嘴腿绿色。此鸟胫部较灰鶲显著短小并多具毛。

黃斑葦鴨 与前种颇似唯体型甚小，体棕黄色不具斑纹，飞时可见翅尖，尾尖黑色。

黑鶲与鶲极似，唯前者嘴腿红色。

水域鳥类除上述的游禽及涉禽外，还常有小型鳥类见于水边，主要种类如下：

1. 体似家燕，灰褐色………家燕、雨燕、灰砂燕
体非家燕状……………2
2. 栖于葦塘丛中，褐色似雀，叫声为煩燥的“扎 扎 吉”
……………大葦鶲
- 栖于水面的突出物上，翠綠色……………翠鳥
- 栖于水边地面，尾作規律的上下振动……………3
3. 褐色，背具纵纹，尾稍短……………水鶲
- 背灰色，不具纵纹，尾較細長……………4
4. 腹鮮黃色……………黃鶲鶲
- 腹及臉白色……………白臉鶲鶲
- 灰砂燕在迁徙时成百十只之大羣，极似家燕，今列

表比較其异同(图17)。

	家 燕	雨 燕	砂 燕
飞翔姿势	翅具明显翼角，尾深叉形，腹淡白色	翅长如镰刀状，尾叉浅，腹暗色	頗似家燕，唯翅較短，尾叉浅；胸前具一暗色带
飞翔状态	少滑翔，揚翅頻繁，揚翅时常褶翅于体側	快速揚翅并伴以滑翔，翅不褶于体側	与家燕相似
栖 止	体水平的栖于电线，树枝，房頂上；亦到地面	体垂直地抓持于垂壁上，不到地面	与家燕相似
栖 居 地	建筑物及附近物体上	多在高大建筑物及山崖上	河边的沙滩附近

猛禽中的鶲类主要在水边翱翔。

二、田野附近的鳥类

本地区的耕地比重很大，村落散在其間；田間杂有种植的小树，以柳林为多，因而构成了迁徙季节許多树栖鳥类的停栖索食地；此外，亦为某些在人类建筑物上营巢鳥类的取食处所。在非迁徙季节种类不多，可以概括的說：夏季主要鳥类为家燕，冬季为集羣的烏鵰。

1. 栖于地上，体型、色都似雀……………鸚、云雀类
多在空中飞翔极敏捷，体黑褐色，翅強健……………2
- 主要为树栖……………3
2. 体似燕，揚翅較急……………家燕、雨燕
体似鶲，很少揚翅……………猛禽
3. 体純黑色或黑白二色，似烏鵰……………4
- 体鮮黃色，常作猫叫声，鳴声悅耳……………黃鸝
体灰、褐或橄欖色……………8
4. 体黑色，叫声为“啊一”……………5
- 体黑白二色……………6
5. 較大，嘴大，鼻孔附近无毛，在阳光的照射下很易識別……………禿鼻烏鵰
- 稍小，嘴小，鼻孔附近有丛毛……………烏鵰
更較小，叫声为尖細的“啊一”，滑翔时翅尖常后傾如噴气式飞机……………寒鴉
6. 尾長极显著，叫声为“嘎嘎”……………喜鵲
尾短似烏鵰，叫声为“啊一”……………7
7. 較大，嘴大，仅脖頸为白色……………白脖烏鵰
較小，嘴小，頸腹全为白色……………寒鴉
8. 具扇状冠羽，嘴細长而下弯，体淺褐色，叫声为“呼一，呼一，呼一”……………戴胜(图18)
- 具丛毛状冠羽，嘴似雀，体淺褐色，尾尖鮮黃色，叫声似串鈴……………太平鳥
- 不具冠羽……………9
9. 体形似鶲，叫声为“咕，咕一，咕”……………10

体形似鶲	11
体形似雀	12
体比雀小形似柳鶯	13
10. 褐色，背具斑，頸側有暗色斑	山斑鳩
灰色，背不具斑，后頸有黑領	灰斑鳩
11. 灰色，臉及尾根白色	灰棕鳥
褐色，具深色耳羽，胸前具斑，尾根磚紅色	紅尾鶲
12. 嘴為特厚之圓錐狀，尾尖鮮白色，飛時翅下緣有極	

明显的白斑紋	錫嘴雀
嘴似雀，尾外側羽多不白	麻雀、雀
嘴似雀，尾外側羽多为白色	鶲
13. 橙綠色，活動性強，常在枝端揚翅趕起昆蟲然后飛捕食之，叫声為細尖的“嗞儿一”	柳鶯

鶲與云雀外觀極似，不易區分，但可注意以下生态特征(图19)。

	栖止	飞翔		鸣声
		起落情况	飞行路线	
云雀	尾不振动	垂直起飞，且当升至一定高度时，常悬停于空中。降落亦如此	不规则的夹水式飞行，在扬翅6-7次后，继以一次夹翅	杂复，常有清脆的捲音如“唧溜儿”
鶲	尾作明显的上下振动，尤以刚落地时为甚	全为滑翔起落不能悬停	规则的夹水式飞行，飞行路线为明显的波浪状	简单的“嗞儿一”

常见种类有：

凤头百灵：褐土色羽，具暗纵纹；有冠羽。

云雀：较前者小，无冠羽。

田鶲：体大如鶲，体侧纵纹不显，有清晰的黄眉斑。与鶲类相近的种类白脸鶲鸽有时亦见于田野地面

上，特征见前。

家燕前已述及，具黄腰者为赤腰燕，不具黄腰者为家燕。

猛禽类虽非全居于此地，但为了便于比较，一併在此讨论(图20)。

	隼 <i>Falco</i>	鷹 <i>Accipiter</i>	鵟 <i>Circus</i>	雕 <i>Milvus</i>	鶲 <i>Buteo</i>
飞翔姿势	翅长，先端尖锐；尾细长，末端截形	翅较短圆，尾长，末端截形	翅宽而长，尾长，末端略成圆形	翅宽大，具显著的翼角，尾末端叉形	翅宽大，尾宽，末端圆形
飞翔状态	翅振动大而急，较少滑翔，作直线飞行	翅振动较小，振翅与滑翔併用，作直线飞行	翅振动大而慢，多滑翔，常在低空飞行	与 鵟 相似	翅振动较大在空中作圆圈滑翔
栖地	田野，水边及城市的开阔地	森林及其附近的田野	多在河边及水塘附近	田野，林缘及城市的开阔地	主要在草原及开阔地

较常见的猛禽有：

红脚隼：红脚，雌雄异色，雄鸟青灰色，飞翔时翅下前缘白色(图21)，常占鹊巢。

黄爪隼：灰翅，余均砖红色(图21)。

红隼：灰尾之尖端具黑宽带；其余均为砖红色杂以暗斑。

雀鹰：灰色，胸腹密布褐色横斑，尾上具四条黑横带。

鹊鵠：黑白二色，远观似喜鹊。

白尾鵠：褐色，尾根白色(图22)。

鵟：俗称老鹰，终年可见。

鵟：褐色，飞时双翅下各具一大黑斑。

麻雀特征明显，不再赘述。常见雀类有：

燕雀：常成百十丈群，体具黑、棕、白三色羽，尤

以雄鸟显著。

朱雀：成小群，头胸鲜红色。此鸟与相近种靠山红的区别为后者红羽有银白色泽。

金翅：体黄褐色，翅侧具鲜黄色羽，叫声如串铃，有时为似“沙一”音的金属声。

鶲类在迁徙时种类甚多，常见有：

小鶲：体小、栗头、顶具三道黑纵纹。

黄胸鶲：体背褐紫色，腹鲜黄色，飞时翅背有明显白斑，尤以雄鸟为著。

葦鶲：为本地数量甚多之冬鸟，体似麻雀唯较瘦细，飞时可見尾发黑色。

灰头鶲：灰头、腹面淡黄。

白头鶲：较麻雀略大，色似麻雀，但头顶中央、眼下、横过前胸全具明显白色羽。

柳鶯難辨種類，其特徵明顯者有黃腰柳鶯及黃眉柳鶯；前者具黃腰，後者不具黃腰但有明顯黃眉，翅側具二白斑。

除以上鳥類外，平原地區夏季還常見有杜鵑，外觀似隼，但以其長的圓尾及宏亮有節奏的叫聲極易識別（圖 23）。此類雖屬典型森林鳥，但由于寄生性產卵的習性，使其分布常依其“寄主”的數量而轉移。常見種有：

	飛翔特徵	鳴 声	栖 地
大杜鵑	體灰色，胸腹部橫紋細、密	二聲：“割谷”	山地林緣，村落及葦塘附近
四聲杜鵑	體發褐色，胸腹部橫紋寬而疏	四聲：“光棍好過”	同 上

啄木鳥類甚稀少，在下文一併討論。

三、山地森林地的鳥類

本地無真正的森林，多系解放後育成的幼林，樹洞稀少限制了樹洞營巢鳥類的分布為本地特點之一；在山頂部常有大片裸岩區，樹木稀少。森林邊緣由於臨近村落，常為烏鵲、喜鵲的營巢地。田野樹林中所遇到的旅鳥多數在此亦遇，這裡不再重複，只着重就林區特有種類及繁殖種類加以討論：

1. 栖于无林的裸岩区 2
- 栖于森林中 6
2. 多地栖，鷦鷯形，常突然起飞伴以“格格”声 3
- 多树栖、烏鵲形或鴿形 4
3. 雄者胸前具大黑斑 斑翅有黑色過眼線交於胸部，胸不具黑斑 石鶲
4. 鴿形、体全黑或黑白二色 5
- 鴿形、灰色具白腰 岩鶲
5. 全黑色、紅嘴，叫声似为“舅舅，救急一，救叫” 紅嘴山鶲
頸腹白色（少數个体全黑），黑嘴，叫声为細尖的“啊” 蛇鶲
6. 在树干上攀緣，体与地面垂直；啄木声如打梆子，并常发出“滴一，...”的叫声，一声比一声短促；作大波浪状飞行（图 24） 7
- 在灌木丛的基部及地面啄食，似雀但背灰蓝色腹白，胁部锈黄色，尾常作频率很快的上下振动 蓝尾鶲
在乔木的树冠枝权間活動 9
常高站在树尖上 18
7. 体綠色 綠啄木鳥
体黑白二色，小型，尾下羽不紅 星头啄木鳥
体黑白二色，較大，尾下羽紅色 8
8. 腹白色，背部全黑 斑啄木鳥

腹棕色	棕腹啄木鳥
9. 体似烏鵲或喜鵲	10
体似鴿，叫声为“咕，咕一，咕”	11
体似鶲	12
体似麻雀	13
10. 黑色，长尾叉状，捕虫时常似上下翻飞	黑捲尾
蓝色，尾較体長，紅嘴	紅嘴藍鵲
灰色具黑頭頂，似喜鵲，叫声沙哑，有时为“啊儿”声	灰喜鵲
11. 褐色，背具斑，頸側有暗色斑	山斑鳩
磚紅色无斑，頸后有黑領，体較小	火斑鳩
12. 鮮黃色	黃鸝
灰色，臉及尾根白色	灰椋鳥
褐色，尾根磚紅色	紅尾鶲
13. 褐色，背多具暗褐色縱紋	14
灰色，背不具縱紋	15
黃灰綠色，翅側有鮮黃色羽，叫声如串鈴	金翅
14. 尾上下振动明显，作波浪狀飞行	樹鶲
尾不上下振动，飞行路綫不規則，尾外側羽多具明显白色	鶲類
15. 尾較長，头多少具黑羽，叫声为“仔仔黑黑”	16
尾較短，眼大而圓，飞捕昆虫，活動性极強，常自枝端起飛捉虫后又返回，很少鳴叫	17
16. 具白臉，背羽发綠，胸腹具一黑縱紋	大山雀
全体烟灰色，頭頂具黑羽，无白臉，叫声較前者細	沼澤山雀
17. 尾基白色，頸部橘黃色，叫声为“沙一”音，頗似紡織娘叫	黃喉鶲
尾基不白，頸部淡白色	灰鶲、烏鵲
18. 背棕褐色，有寬黑紋过眼，尾常前后搖動頗明显（图 25），叫声燥厉	紅尾伯劳
背橄欖綠色，尾常作規律的左右搖動，并伴以似金屬的“嘎滋，...”声	山鶲鶲
山地鶲類主要有灰眉鶲及三道眉草鶲，前者体全棕褐色，头部浓灰色；后者背褐腹白，有黑色過眼線，眼上下各具一白紋。	
柳鶯類在遷徙時亦多，鑑別見前。	
除以上所述種類外，山地草坡疏林地有時可見雉鷄；以其長之尾及頸下的白環很易識別；在秋冬季亦常到山腳、田野活動。	
以上概略地對本區常見鳥類分作水域、田野及山地森林三种栖息类型作了討論，當然這種分法是有条件的，实际上很多種類常不止在一地栖居，如猛禽、鳩鴿就常栖于森林、山崖但取食于田野。	

参考文献



图 1 游禽的游泳姿势
上行：天鵝，秋沙鴨，野鴨，潛鴨，雁
下行：鶲鷺，鶲鷺，鶲鷺，鷺，骨頂



图 2 鶲鷺的飞翔




图 3 鶲鷺的飞翔




图 4 鶲与鷺的栖止和飞翔




图 5 鶲与鷺的飞翔
(右方模式图为双翅的前面观)



图 6 燕鵙




图 7 沙錐



图 8 金眶鶲




图 9 林鵠



图 10 磯鶲



图 11 鷺与燕鵙的飞翔



图 12 綠頭鵠




图 13 斑嘴鴨




图 14 冠鴨




图 15 花脸鴨




图 16 針尾鴨




图 17 家燕, 砂燕, 雨燕的栖止和飞翔姿势



图 18 戴胜的栖止和飞翔




图 19 云雀和鵟

A. 云雀, B. 云雀飞行路綫(圆圈表示悬停处),
C. 鵟的飞行路綫

图 20 猛禽的飞翔姿势

上行: 鵟, 鹰, 隼; 下行: 鹰, 鵟



图 21 黄爪隼和红脚隼




图 22 白尾鷂



图 23 杜鹃的飞翔




图 24 啄木鳥的栖止和飞翔路綫



图 25 伯劳的摇尾姿势

- [2] 郑作新等: 1959。中国动物图譜——鳥类 I, II 册。
[3] 包桂浚: 1956。河北通县鳥类报告。北京师范大学学报(自然科学版) 1:109。
[4] 下村兼史: 1955。原色日本鳥类图鑑。
[5] Pettingill, O. S.: 1956. A laboratory & field manual of Ornithology.
[6] Shaw, T. H. (寿振黃): 1936. The birds of Hopei province.
[7] Wilder, G. D.: 1938. Birds of Northeastern China.
[8] Промитов, А. Н.: 1957. Птицы в пририде.