

紅胸黑雁 *Branta ruficollis* (Pallas) 在中国的发现

鄭 作 新

(中国科学院动物研究所)

紅胸黑雁为雁亚科(Ancerinae)中羽色最幽雅者。头黑,两侧自眼至嘴基間各有一椭圆形白斑,头侧后部色白,其中部綴以肉桂栗色,略成块斑状;后頸黑,頸側各有一白色带状纵紋,与头侧的白色部分相连接;頸基有白色領状狭紋,向下介于栗胸与黑腹之間,形成圈状。背和腰均黑;尾上复羽白;尾羽亦黑,而具白端;两翅与背同,中和大复羽的先端带棕,因成二道横带。

下体自前頸至胸鈍栗,上腹黑色,栗、黑两部間,間以白紋,前已述及;下腹和尾下复羽純白;两脇白,下脇的羽端黑,迭成三道横斑;腋羽深灰。

嘴峯 26, 翅 334, 尾 108, 跗蹠 53 厘米(性別不詳)。

所得的标本是一只幼鳥,由我所工作人員于 1960 年 1 月 15 日在洞庭湖向猎戶购到的。成鳥的黑色較

深,尤其是下脇的横斑,栗色亦較浓,在头侧后部的栗色块斑更形发达,而白色却縮小而变为栗斑的边緣。

据文献記載,此黑雁单独或成小羣繁殖。巢置于地面稍凹处,并有丰厚的絨毛为垫。它的叫声尖銳,很有音調,略似“kee-kwa”,“kit-wit”,“ti-che”等(Dela-cour)。取食时,常不断发出嗞声。

此鳥繁殖于西伯利亚西部的冻原中,自鄂毕河至哈坦加河(Khatanga)流域。越冬主要在里海南部和亚烏魯尔海或称咸海(Aral Sea)。曾經偶見于格陵兰島(Greenland)、冰島(Iceland)、斯堪的納維亞(Scandinavia)半島以及欧洲大陆,南抵非洲的阿尔及利亚(Algeria)和埃及,东至亚洲的伊拉克和印度的亚薩密(Assam)。这次由我国洞庭湖中采得,实为此种黑雁冬时分布最东的一例。