

中草药治疗水貂疾病的初步试验

山东省荣城县水貂场

我们遵照毛主席关于“自力更生，艰苦奋斗，破除迷信，解放思想”的教导，试用了几种中草药、土方治疗水貂疾病，初见成效，现整理如下，仅供参考。

一、金钢菊治疗水貂乳房炎

1969年我场水貂发生乳房炎，采用青霉素注射及热敷治疗，费用昂贵，效果不大。由于打针和热敷，哺乳期中仔兽死亡较多。后改用金钢菊治疗，效果很好。在产仔期可作大群预防，也可作重点治疗。把药汁拌入饲料中，不影响护理仔兽。用量：取金钢菊（干品）5克，水煎，取药汁拌饲料喂服。日服2次，1—2日可愈。作大群预防时，以平均每头貂2克用量计，服法与前同。

金钢菊又名望江南，一般以种子入药，根、茎、叶也有相似效果。在民间是治疗人的乳房炎良药。使用安全，无副作用。

金钢菊春秋播种，结荚后待种子成熟即可采集。

二、紫参治疗水貂肠炎

紫参的效果和土霉素相同。因为是本地产的，经济方便。

紫参又名虾参，拳参。色紫褐，味苦涩。生长山区背阴潮湿处，取其根入药。用量每头2克，水煎服或研成细粉拌入饲料喂服，日服2次。亦可作大群治疗，效果好。

三、四妙勇安汤治疗水貂脉管炎

四妙勇安汤是治疗人的脉管炎的土方。1970年夏季有8头仔兽发生烂腿，其中7头在右后肢，一头在左后肢。开始发白肿胀，1—2天后皮肉脱落，露出骨头，骨节脱落，病情由爪延伸至腿。用青霉素注射及外抹均无效。后与本村卫生所赤脚医生一起去医院访问，用此方治疗，取得较好的效果。服药后，病情停止，消肿收口。为证实药物的作用，中途停药2天，病情又继续发展。再次用药，此8头貂全部治好。一月后，除脱骨节不能再生外，创面全部长好，并发生新毛。

对于水貂如何得脉管炎的病理机制不明，只是以此药治好的，症状与人的脉管炎相同而确定为脉管炎病。配方及服法：丹参、元参、双花、甘草，各等份，水煎服，不限数量，可拌入饲料或饮水喂服。

四、食醋热敷治疗水貂仔兽脱肛

仔兽因长期拉痢，引起直肠脱出肛门，重者可造成死亡。过去用针刺，因深度难于控制，疗效不甚明显。后改用食醋热敷，效果明显。

热敷时，先用棉花沾温热食醋洗涤脱肛直肠，洗后直肠表面发粘、收缩，轻微脱肛就能自行复原，重者可用棉花球将直肠轻轻推入，然后再按住固定几分钟。一般治疗1—2次即可全愈。此法经济，操作方便，效果好。

五、牡蛎粉治疗外伤

用牡蛎壳（又称海蛎子皮）煅烧后研制细粉，可代替磺胺结晶治疗外伤。牡蛎粉撒在创面上，能形成一层不易脱落的保护层，使创面与空气隔绝，疗效较好。化脓的伤口可加少量冰片（约5%），效果则更好。

内服牡蛎粉还可以治水貂肠胃炎，用量每头2—4克。

六、水杨酸合剂治疗水貂癞皮病

1969年春有几头公兽面部生癞，初步认为是炎症，用青霉素治疗无效，而后又用VB₆治疗，治了六个月药费达30余元，病情恶化，面部肿胀，拒食，精神不振。采用群众土方水杨酸合剂治疗，第二天精神有所恢复，面部有消肿现象，7天后开始脱痂。

此方对有传染性的自咬病有效，对非传染性病有抑制作用，其作用与普鲁卡因封闭相似。

七、土方治疗水貂尿道结石病

此方是从文登县高村公社卫生院访取的。配方：鸡内金3—4钱、芒硝3钱、火硝3钱、硼砂3钱（以上四味为主药），海金沙5钱、滑石1两、琥珀2钱、车前子3钱、茯苓3钱。煎时滑石粉、海金沙用布包，芒硝、火硝、硼砂为后加药。水煎服，日服2次，1付药可喂10次。

八、对自咬及食毛症的探讨

对于自咬及食毛的看法比较多，有的认为是两种不同的病，有的认为是相似的病，只是程度不同。在病因研究方面看，有的认为是真菌而致，有的认为是病毒

而致，也有认为是饲料中谷物偏少，也有认为是谷物偏多、热量过高等。由于我们缺乏知识，也没有进行细菌学检查及切片观察，对这些论点无从信取。只是在现象上分析，估计是由于皮肤发痒而自咬或食毛，因此将自咬和食毛列在一起。

在治疗中发现，自咬及食毛只是外观表现，其实质是不相同的。如有的自咬的貂，其笼舍不加消毒，将一健康的水貂放入饲养，发现健康水貂也发生自咬，从现象上看是传染性的，在治疗中采用上述治疗癞皮的方法，可取得良好的效果。而有的没有传染现象，这一类型比较多些，也难治些。我们采用的方法，对自咬及食毛都进行试验，都取得一定成效，但没有一种方法对所有自咬及食毛都有效。其结果与以前材料中介绍的方法相似（如大蒜汁洗；普鲁卡因封闭；火灼；高锰酸钾液注射；高锰酸钾、甘油灼烧；巴比妥、盐酸氯丙口服等）。

总之，二种病的原因不明确，经用以下几种中药试

验，各有一些疗效，但都不很理想，有待进一步研究。

方 1. 沙参 6 钱，党参 6 钱，紫参 6 钱，丹参 6 钱，苦参 6 钱，何首乌 5 钱，大艽 6 钱，防风 6 钱，灵仙 5 钱，荆芥 4 钱，当归 6 钱，白芷 4 钱，地夫子 6 钱，百部 6 钱，荆子 5 钱，茵陈 6 钱，苍术 8 钱，甘草 3 钱，白癣皮 4 钱，床子 1 两。

用量：每头 5 克，每天二次，水煎服。

此方在 7—8 月服用效果好一些。15 天为一疗程，可用作大群预防。

方 2. 白癣皮 3 钱，双花 5 钱，防风 3 钱，荆芥 3 钱，苦参 4 钱。

用量：每头 5 克，每天二次，水煎服。

方 3. 白癣皮 1 两，白矾二两，水煎熏洗。

方 4. 白癣皮 1 两，马齿苋 1 两，木槿皮 5 钱，水煎熏洗。

后两方对皮肤上有红点的食毛症效果较好。