

# 白头鹎的食性

庞秉璋

(江苏省太仓县岳王公社卫生院)

白头鹎 *Pycnonotus sinensis sinensis* 为苏南留鸟,苏州地区称:白头(常熟、沙洲),白头公(苏州),白头翁(太仓)。见于城镇、市郊、农田和丘陵。数量较多,为优势种。1965—1976年作者在苏州,昆山,吴县及太仓等地剖验了232个鸟胃结果见表1。

由表1可见白头鹎为杂食性鸟类,1—4月和9—12月食植物性食物,5—6月食动物性食物,7月份兼食动、植物性食物<sup>1)</sup>。就季节来说,冬春食植物性食物,春夏之交及夏秋之交食植物和动物性食物,食物随季节而变更,其间有过渡阶段。

白头鹎主食植物果实,种子,叶芽和昆虫

等。嗜食椋实,据野外观察常在树上啄食,一次可连食2—3枚,食后椋核吐出,经实验种植吐出之核仍能发芽出苗。11月下旬至2月下旬食青菜,在剖验的176个胃中仅见13次,对蔬菜为害不大。11月中旬至12月上旬食小麦,在剖验的166个鸟胃中仅见11次,故为害不大。啄食蚁,避债蛾幼虫,蚜虫等害虫,亦食小蜂、步行蚱等益虫,但所食种类害虫多于益虫。冬令避债蛾幼虫结茧越冬,在野外观察白头鹎系破茧由茧底部将喙伸入,由茧内将虫拖出吞食。

除此之外,白头鹎还啄食一些植物果实,偶食蜗牛等。益害相较,益多于害。

表1 白头鹎食性分析表

日期		地点	只数	植 物											动 物				其 它	空胃				
年	月			椋实	葡萄	女贞	蔷薇果	枸杞	冬青	枸	小	青	繁	苜	其	蜗	小	避			其			
65	11	苏州	1	1																				
	3		1																					
*66	11		3	3																				
	12		1																					
	1		1	1																				
	3		2																					
	4		1																					
67	5		2							1														
	6		1															1						
	10		2		1			1																
68	2	1			1																			
	11	1	1																					

1) 根据1975年7月21、22日雏鸟礼颈试验,白头鹎亦食螳螂、麻纹蟻、螻蛄、尖头蚱蜢、蜻蜓、蜘蛛等。

日期		地点	只数	植 物										动 物				其 它	空胃		
年	月			实	荷	女贞	蔷薇果	枸杞	冬青	枸	小麦	青菜	繁缕叶	苜蓿叶	其它	蜗牛	小蜂			避债蛾幼虫	其它
69	3	昆山	1			1															
70	4	吴县	1																铁屑,		
	9	苏州	1											商陆果,							
72	2	太仓	3	2									1						I		
	3		2										2								
73	11		2	2																	
	12		5	4																	
74	10		2			1									种子,	1		鞘翅目昆虫,			
	11		63	18		1	1	2		3	4				绿色植物,			螻蛄,		39	
	12		103	55		6		1		8	7		1	乌桕, 麦叶,	2					24	
75	1		9	9																	
	2		1																		
	3		14	11										2	芸苔叶,						
	4		2	2																	
	7		3		1														步行蚱,		
76	4	3	1					1						芸苔花,	2						
剖验只数总计			232	110	2	8	2	3	2	2	11	13	3	3	12	2	3	2	5	2	64
取食频次总计			249	171										12				2	64		