

大鸨的冬季生态和狩猎*

晏安厚

(江苏省江都县真武公社高楼学校)

高邮湖水面宽阔，滩多水深有丰富的天然饵料，因而成为各种禽类觅食、越冬的好场所。每年冬季有一定数量的大鸨 (*Otis tarda*) 来此越冬。

大鸨又名地鹑，为大型的走禽。雄鸨体形大于雌鸨。颈下有须状羽，雌鸨无。雄鸨的尾羽比雌鸨长。当地群众误认为鸨无雄鸟，传说它是百鸟之妻，实则毫无科学根据。这是由于雌雄区别不大，把雄鸨误为雌鸨的缘故。

大鸨是苏北地区的冬候鸟，一般每年在 10 月下旬结群迁来，冬至到立春期间大鸨最多，直至翌年 4 月下旬飞离。

大鸨在苏北的高邮湖、宝应湖数量较多，邵伯湖次之，南至扬子江畔的江滩上，均有它的踪迹。但在人烟稠密的地区很少见到鸨的踪

迹。多在人类活动较少的半围垦区活动、觅食，它喜食肥嫩的蒿草、麻菜、它吃一些麦苗、豌豆苗、蚕豆苗等。吃食时以嘴叼草的一端，抬头向上用力将草拔断，然后囫囵吞下。亦吃一些早春活动的昆虫。曾在湖滨公社王港及其大官滩一带多次观察。大官滩的地势较高，滩面较大，水草丰富，是四面环水的干滩。平时很少有人进入。故此地常有一、二十个鸨群在此栖息，每群有 20—50 只，多的可达二百余只，小群亦有四、五只，个别活动的极为罕见。鸨群常飞往王港附近湖滩活动、觅食。鼓翅飞行时，动作象苍鹭，但颈不弯曲，两腿向后下方斜伸，飞行时

* 本工作曾访问高邮县猎户杨庆林、杨尚银，江都县猎户杨新民等。太仓县庞秉璋同志给予指导。照片由上海西郊公园何宝庆同志提供，特此致谢。

两翅平展,与鸕相似,停落前如家鸽,两翼稍向上翘,呈圆弧轨迹。大鸕比较机警。整群降落后,总有三、四眺望远方。人在距它三、四十米时,就奔跑或起飞;飞的高度离地面3米左右,飞到200多米远的地方落下。在无人或其它动物干扰的情况下,可长时期成群停留在一处,不轻易走动和起飞。有时两只落于一地或两只相距十多米处,一般停留在滩边围埂缺口处。在滩心栖息的鸕,跟滩心枯草颜色相似,难以发现。它们在活动、觅食后,又整群返回大官滩栖息,往返飞行时无一定的队形。

当地猎户根据大鸕的习性,常用以下几种方法捕猎:

1. 枪猎法: 本地猎户使用的猎枪有大小两种,小的叫射枪,手持瞄准射击,便于携带,但射程不远,杀伤面小。大的叫铕枪,射程较远,捕获量大,但要有固定的场所,在陆地上以木架支撑。水上作业时将铕枪绑在枪划子上。

空中围打法: 大鸕栖留性较强,常成群在一块干滩上活动,很少超出固定的范围,在高邮湖畔的猎户,常利用这一点,选择鸕经常活动的草滩进行空中围打,围打时用短木架架牢铕枪,用枪多少以鸕群多少而定,少时用五、六支,多时可用二、三十支,每支铕枪用麻绳扣枪机,猎人手持麻绳远离铕枪,在铕枪周围用草伪装。此外还有三、四个猎手哄赶鸕群,这些猎手要灵活机动,把鸕群集中在一起,当鸕群起飞时,猎手拉绳扣机,群枪齐鸣,此法捕获量大,据猎户扬庆林介绍,用此法最多捕过173只大鸕。但须要人力物力较多,还要弄清鸕群活动规律,否则难以得到理想的效果。

游击法: 此法是猎户分散活动,以射枪击少数分散的小群地鸕。一般由两人配合猎狩,声东击西,虚实并行,并能充分利用鸕善于奔跑,不善高飞的特点,行猎时两猎手在不同方向前进巡找猎物。鸕在湖滩活动,发现对面有人,常有掉头快奔或低飞的特点,注意不到背后猎手鸣枪射击,此法效果较好。

其它方法: 猎户有时用枪划子(图1)在湖面巡找滩边觅食、饮水之鸕。一般是一人一划




图1 枪划子(单位:毫米)

活动于近滩边的湖面。划上绑着铕枪。猎手俯伏于划上,两手持小桨划水前进,动作要轻快,几乎没有水声。刚发鸕群时动作要慢,接近滩边鸕群时动作要快,选择适当的时机鸣枪射击,此法捕获量不大。但能兼捕野鸭或其它野禽。猎鸕时要注意枪划子的前舱(水舱)不能装水,将船头压低,否则火力达不到滩边。有的猎户事先选择捕场,在场内以苍鹭、白鹭和大鸕加哨,招引鸕群。

2. 网捕法: 本地区无特殊捕大鸕的网具,常以捕鱼、捕龄鸭的网具进行捕鸕。网具有拉网和围网(用渔民捕鱼的罾网代用)两种(图2)。围网张于鸕群经常活动、觅食的干滩,在黄




图2 围网

图3 扣套

昏时或黎明前布葫芦形天网,地网利用滩面,网边有扣绳,扎在滩面短桩上,网口扎有弹性的竹片,张网时用一根小竹竿将网口撑成圆弧形开口,一猎手持拉绳,伏于捕网远处隐藏,其它猎手向网口方向赶鸕,但行动不可操之过急,以免受惊起飞,鸕群发现后边有人,渐渐向天网方向奔跑或低飞,最后进入网内,持绳猎手拉绳倒竿,因竹片的弹力,及网口两侧的的拉簧的拉

力,将网口很快向左右两边移动,网口紧扣于滩面,网内的鸨一时难以逃出网外。有时猎户为了多捉鸨,在网内布有鹛鸨,引诱鸨入网合群,捕捉效果更佳。

3. 扣捕法: 用细麻绳制一个圈套,另一头固定在木桩上(图3),扣下在鸨群经常活动、觅食的干滩上,扣套隐藏在绿草丛中,鸨在叼草时就被套上,摇头挣扎时,活扣越来越紧,使鸨窒息死亡。有时也能套住鸨腿。下扣时要了解鸨群活动的规律,扣绳要结实,扣桩入地要深,布扣数要多,扣套大小要适中,过大容易脱套,过小时往往不能扣住,装扣后要管理扣场,清除人为的痕迹,有利于扣捕大鸨。

大鸨体重一般5—6公斤,有的可达10余公斤,雄鸨比雌鸨重。脂肪丰富,肉味与鸡相

似。大鸨的飞羽(膀翎)较长,可羽扇。其它胸羽、尾上复羽、尾羽、腋羽及下复羽等,可制作工艺制品。

但大鸨为国家保护鸟类,必须根据当地有关部门的规定进行捕猎,不得乱捕滥猎。




图4 大鸨隐蔽于草纵间