

# 我国古代关于朱鹮的某些史料与考释

庞秉璋

(上海纺织第二医院)

朱鹮 *Nipponia nippon* (Temminck) 是将濒临灭绝的世界珍贵鸟类，近几年仅在我国，日本，南朝鲜有发现，数量甚少，亟待保护。1957年中国科学院动物研究所在陕西省洋县采到几只。1964年6月在甘肃省康县岸门口采到。1978年复旦大学在宁海海边见到过。1981年5月在陕西洋县喜见七只。

朱鹮的别名，既往籍载有：朱鹭，红鹤，吉祥鸟，鵠朱鹭，凤头鸴，凤头朱鹭，朱脸鸴鹭。古名鵠，鵠目，旋目，翾。古代即有记载。

朱鹭之名见于《禽经》，此书相传系春秋时师旷所作，晋张华注，但据籍载内容征引资料，大概是托名的唐宋时代著作。

红鹤之名见于明代汪颖《食物本草》，书中述及鹭，并有“又有红鹤，相类色红，《禽经》所谓朱鹭是也”。

由此可见红鹤即朱鹭。关于红鹤，李德(Read, 1932)<sup>1)</sup>定为紫鹭 *Ardea purpurea manil-*

*liensis* Meyer, 朱建霞(1936)<sup>2)</sup>定为池鹭 *Ardeola buccchus* (Bonaparte)，这两种鹭体部为紫与苍色，非红色，与红鹤之名不符。今陕西称朱鹮为红鹤，朱鹮在日本汉字作朱鹭，则古籍中的红鹤(朱鹭)当以朱鹮较符合，但是否即朱鹮尚待进一步考证。

明李时珍《本草纲目》禽部，禽之一，水禽类鶲鶴条后的附录中所载的旋目即朱鹮。

据《本草纲目》记述“旋目，水鸟也，生荆郢间，大如鹭而短尾，红白色，深目，目旁毛皆长而旋”。朱鹮大小如鹭鸶。额，眼周，头顶，上下嘴基部周围裸出部橙朱红色，跗蹠和裸露的下胫亮红色。羽色白，沾染粉红。枕部及后颈的冠羽长而弧旋，似“目旁毛皆长而旋”。按此体色，

1) Read, B. E. 1932 Chinese Materia Medica Avian Drugs from Pen Tsao Kang Mu Peking Natural History Bulletin.

2) 乔风等编译 1936 中国普通动物 [(附录二《本草》中的禽类)朱建霞译述]。

形态及生态均符合。我认为旋目即为朱鹮。

鸚之名，见于《史记·司马相如列传》“鸚鵡、鶻目”。鶻即鸚，有三种读音：1. 音喧 xuān，见《正韵》。2. 音还 huán，见《集韵》。3. 音旋 xuán。按《汉书》及《文选·上林赋》鸚目作旋目，“旋”与“鸚”同，鶻目即旋目。《本草纲目》将旋目作为附录，序列在鸚鵡之后，系根据《史记》“鸚鵡，鸚目”而言，以见旋目(鸚目)是与鸚鵡(即池鹭)相类似的一种鸟。唐司马贞《索隐》引颜师古注：“荆郢间有水鸟，大如鹭而短尾，色红白，深目，目旁毛皆长而旋，此其是乎？”。《本草纲目》当是转录其注而略改字句，将“荆郢间有水鸟”改为“水鸟也，生荆郢间”，“色红白”改为“红白色”，“此其是乎”一句删去。

关于旋目，李德未定名，朱建霞定为大麻鳽 *Botaurus stellaris stellaris* (Linnaeus)。大麻鳽羽非红白色，实非旋目。

清李元(生当乾隆与嘉庆年间)《端范》卷五，物性载“旋目曰翶”。翶(音喧 xuān)，小飞貌，意为缓飞轻飏，与前述鸚的“喧”音相同。据西汉扬雄《扬子法言》“朱鸟鸚鸚，归其肆矣”，音义类同，“翶”也就是“鸚”。

宋鸚在我国见于东北中部，河北，河南，山东，山西，陕西，甘肃，安徽，浙江，福建，台湾及海南岛。按上述史料，古代尚见于荆、郢(地当今湖北省)，而现在湖北境内不见，可见古今区系分布有些不同。

综上所述，朱鸚最早记载见于西汉司马迁所撰《史记》，约于汉武帝太初元年至征和二年间成书(即公元前 104—公元前 91 年)，可见在距今 2000 多年前已有记载，我国实为世界上很早或最早记录朱鸚的国家。朱鸚的鸚字虽有三种读音，但据《史记》“鸚目”与《汉书》“旋目”的名称，朱鸚宜读作朱鸚(xuán 音旋)。