

家 养 塘 虱 鱼

塘虱鱼在广东省分本地塘虱（胡子鲇 *Clarias fuscus*）和泰国塘虱（蟾胡子鲇 *C. batrachus*）两种。其食性杂而贪食，多在晚间活动，能在多种水体生长，常栖息在阴暗处或洞穴中，水温降到 4℃ 时易冻死，要做好越冬防寒工作。其饲养方法简单，可利用庭院空地或宅内天井筑池家庭养殖。鱼池面积可因地制宜，水深 0.5—1 米左右。池底放瓦管或毛竹，其长度 0.5—1 米为宜，便于塘虱栖息和捕捉，池底设排污口，在池壁上方设水位口，管口设铁丝网防逃。还可在水泥池壁上端建几个干湿小洞，让塘虱鱼自由出入。当池中水质恶化，天气闷热时，塘虱鱼会避到小洞中。

放养密度视水源、种苗来源和饲料情况而

定。静水池每平方米放养体长 3—7 厘米塘虱鱼种 100—150 尾；若每天能加注新水 1—2 担的鱼池，每平方米可放养 200 尾左右，也可分批放养，分批捕捞。每平方米鱼池可产鱼 10 斤左右。

农村家庭养塘虱鱼以投喂孑孓、蝇蛆动物饵料为主。有的养鱼户用 60% 熟番薯，20% 花生麸、20% 米糠，加少量畜用鱼粉、生长素，揉成团状投喂。这种混合饲料利用率较高，鱼类吸收良好。每天投饵量约为鱼体重的 6—8%，其他菜叶、浮萍、剩饭、动物内脏、蜗牛、河蚬、蚌等均可投喂。

（广东省高州县畜牧水产局 谭 平）