

凤头麦鸡

庞秉璋

(上海纺织第二医院)

凤头麦鸡 *Vanellus vanellus* 在江苏为冬候鸟，地方名称为扯旗，皂隶。

每年 11 月至次年 3 月，凤头麦鸡来此越冬，留居 4 个月。1975—1979 年在太仓观察，最早见到日期为 11 月 24 日，最迟见到日期为 3 月 21 日。见于江边，水域，田野及滩地。一般呈三、五小群或二、三十只的群游荡觅食。大群少见，1977 年 1 月 1 日在嘉定偶曾见到约 70 只的群。

性机警，不易接近。警戒及兴奋时冠羽竖

起，活动时常停立伸颈瞭望。善走，行步，轻盈而速。行走时常会突然立停，低头俯肩以作平衡，止步啄食食物。受惊时常静立不动，由于背部羽亮绿，如果背部向人，在苜蓿田、麦田，车前、波斯婆婆纳等深绿色杂草地内；在遮荫暗处及暮间上体视之色暗与泥土相似，瞬息间不易发现，注意寻觅或待行动时可见到，若至窘迫会突然起飞，发出惊叫，受惊后群飞不远，往往就在附近降落。起飞时飘悠缓慢，翅音呼呼，声如挥扇。飞行颇特殊，行踪不定，时而向前，忽又迴

转，翻腾向下几及地面，随后又迴转贴地低飞，忽上忽下，很少持续直飞向前。日落时，常面向落日，在落日处观察，由于腹面白色，远望颇似群聚的鸥鸟。迁徙时在高空飞行甚速，飞翔力强。江苏一带结合农时，冬令开塘挖泥，兴修水利，常能招引凤头麦鸡飞来，在翻松的河床和塘边土堆以爪扒地搜觅食物。啄食后嘴如沾泥，每在水中洗涤。鸣叫有轻柔或粗涩的声音。

凤头麦鸡为杂食性鸟类。1975—1976，1978—1979年冬、春期间，曾剖验16个鸟胃，

食性分析见表。据表示，主以动物性食物为食，所食有蜗牛、鳞翅目昆虫，水龟等有害动物，亦食少量蚯蚓，鱼等有益动物。植物性食物所食较少，为野生植物的茎、实，偶食小麦。

凤头麦鸡体大，毛重4—5两，猎人言称“皂隶半斤把”（意为半斤左右），江苏常猎作野味，但肉味欠佳。味既不美，宜勿猎加以保护。此鸟易养易驯，可加利用，捕获后将飞羽的羽干，用针引线依次贯穿扎缚，放养于林场，花园，菜地，苗圃及庭院，能消除蜗牛及害虫。也有供展览观赏价值。

凤头麦鸡食性分析表

日期		地 点	只 数	植物性食物				动物性食 物					砂砾	
年	月			小麦	草 茎	槐 实	植物种子	蚯蚓	蜗 牛	小 螺	鳞 翅 目	水 龟	鱼	
	1	太仓	3		1			3	2		3			
	2		1		1				1	1		1		
75	3		1						1					
	11		3						3					
	12		5				1		3			1	2	2
76	1		1	1										
78	12	江都	1			1								
79	1	太仓	1						1					
剖验只数总计			16	1	2	1	1	4	10	1	3	1	1	2
取食频次总计			29	5				22						