

山 鹊 鸲 在 桂 林 繁 殖

龙 国 珍

李 汉 华

(广西科学院生物研究室) (广西师范学院生物系)

山鹊鸲 (*Dendronanthus indicus*) 隶属于雀形目鹊鸲科山鹊鸲属。据郑作新教授著《中国鸟类分布名录》1976 记载,此鸟在福建南部,江西,广东和海南岛,广西,云南为旅鸟、冬候鸟。另据杰门捷也夫 (Деметьев) 等 1951—1954

《苏联鸟类志》第五卷第 648 页记载,山鹊鸲繁殖地的南界未查清。在缅甸有繁殖可疑记录。又据伊万诺夫 (Иванов) 1961 年¹⁾记载,在云

1) 伊万诺夫 А. И. 1961 动物学报 13(1—4):82

南普文, IV20, 21, 25; 麻栗坡, V2, 3 采得的全部鸟均披着婚前新羽。并认为当时在云南采得的标本, 可能均在繁殖地带的南部繁殖。但未进一步得到证实。

1982年6月8日, 作者在广西桂林南郊雁山广西植物研究所内发现山鹊鸲巢, 这是迄今为止山鹊鸲在国内繁殖地的最南记录。

我们还于6月8日10时至19时30分和9日5时至13时, 对亲鸟育雏进行观察, 并测量了雏鸟和巢, 现报道如下:

巢做在高约40米的野桉树(*Eucalyptus rudis*)上, 巢置粗约7厘米的分枝上, 距主干约60厘米。巢距地面高约32米。巢呈碗形, 由棕丝和少量白色和黑色长毛发编成, 较精致, 最内层夹有三支小羽毛, 无内垫物。巢外饰以绿色和褐色苔藓及少量蛛丝, 使巢色与树皮的一致。巢周有小枝和叶遮住, 较隐蔽。巢外径90毫米, 内径60×64毫米, 巢高40毫米, 窝深35

毫米。巢内有数以百计的螨。

巢雏5只, 双亲共同喂养。从两天的观察得知, 喂雏从5时天微明开始, 5时至9时, 每小时喂14至16次, 9至10时喂11次, 11至12时减到8次。黄昏, 18时至19时又增到11次。8日夜未见成鸟入巢过夜。雏鸟排出的粪便大都由亲鸟用嘴接住, 衔至巢外十余米抛掉, 有时用嘴从巢中找出, 抛掉。

6月9日13时, 作者上树摄影, 近至1.5米时, 雏鸟全部惊飞出巢, 飞至10到20米远。捕得其中两只, 测量如下: 体重15, 16克; 体长86, 92毫米; 嘴峰7, 7毫米; 翼长53, 54毫米, 尾长22, 22毫米; 跗蹠24, 24毫米。头顶两侧有浅色胎绒羽。雏鸟眉纹黄白色; 翅黑褐带绿色; 翼有浅色宽斑。腹面浅色, 前胸有一条黑色环纹和另一条中断的环纹。外侧两枚尾羽白色。雏鸟也有山鹊鸲特有的扭摆身体的动作。