

陕西大巴山发现的岩松鼠黑色变异

郑永烈 姚建初

(陕西省动物研究所)

1982年我们在大巴山西端的西乡县大河坝和镇巴县长岭地区调查工作中,分别从猎民手中获得黑色松鼠皮4张。通体黑色。体背毛色从头部至尾全部为黑色,混杂有极少数白色* 针毛。腹毛及前后足毛亦全为黑色,毛基黑灰色。尾毛粗硬蓬松,毛色亦呈黑色。岩松鼠背部自头顶至尾基,体侧和四肢外侧均为青黑黄

色。腹部为黄赭色。尾背毛如体色,但针毛尖端为白色,故尾侧如蒙有白霜,尾腹暗黄。耳背 后侧有一污白色斑,眼周具黄白圈。

经鉴定,外部形态特征均于岩松鼠完全一致,应属岩松鼠 (*Sciurotamias davidianus* Milne-Edwards) 的黑色变异。此种松鼠的黑色变异相当少见。

表1 外形量度 (长度:毫米)

采集号	日期	性别	体长	尾长	后足长	耳长	采集地
区 82004	1982.7	♀	268	118	48.5	24	西乡大河坝
区 82005	1982.7	♀	231	121	51.5	22	西乡大河坝
区 82009	1982.6	♀	228	120	50	23	镇巴长岭
区 82008	1982.8.11	♂	244	123	53.4	25.1	镇巴长岭

多栖息于海拔 1000—1540 米之间中山的落叶阔叶混交林和灌丛交接处的岩壁和乱石堆间，该处主要树种有马尾松、槲栎、栎树、黑壳

楠、鹅掌楸及核桃、栗树等；灌丛有映山红、槭木、马桑、火把果、山胡椒等。