

斑头鸺鹠在泰山等地为留鸟

杜 恒 勤

(山东省林业大学)

文献记载，斑头鸺鹠 (*Glaucidium cuculoides*) 在国内分布区是：长江以南各省，西达云南西北部、四川雅安及西南部会东，北至河南南部、陕西南部及甘肃南部武山(留鸟)；偶见于山东潍县(郑作新 1976)。笔者 1982—1985 年进行泰山鸟类调查时，1982 和 1983 年的 11 月下旬，于黄昏时刻，多次观察到斑头鸺鹠停站在青年路五金交电站的楼顶和林业学校水塔顶等处，夜间并闻其 hooloo—hooloo 的叫声。1982 年 2 月，1 只斑头鸺鹠进入鸡舍内，经剖胃检析，全是鞘翅目昆虫碎片。1985 年 5 月 15 日，东半岛西部，鲁中南山区。位于东经 $117^{\circ}5'$ — $117^{\circ}24'$ 、北纬 $36^{\circ}5'$ — $36^{\circ}75'$ 。徂徕山位于东经 $117^{\circ}16'$ — $117^{\circ}20'$ 、北纬 $36^{\circ}02'$ — $36^{\circ}07'$ 。泰山、徂徕山与惠民地区所处经纬度相近，但在山东省的地理区划上，泰山、徂徕山位于黄河之南，属鲁中南山区一部分，惠民地区在黄河之

在泰山观察一窝孵卵的斑头鸺鹠，巢是在距地 1.1 米的石洞内，有卵三枚。1986 年 4 月 24 日至 6 月 5 日，在徂徕山观察一窝繁殖的斑头鸺鹠，其巢是在大口井壁的洞内，是强占的白鹡鸰 (*Motacilla alba*) 的筑巢处所，产有四枚卵。笔者经过几年的调查，斑头鸺鹠在泰山、徂徕山，是一年四季都能见到的鸟类。

据山东省惠民地区林业局进行鸟类普查时获得的资料，斑头鸺鹠在惠民地区亦是留鸟。惠民地区地处鲁北黄河下游，位于东经 $117^{\circ}15'$ — $118^{\circ}22'$ 、北纬 $36^{\circ}41'$ — $38^{\circ}16'$ 。而泰山处于山北，为鲁西北平原的一部分，两地的地理位置、生境，在山东省有一定典型性。

上述可知，斑头鸺鹠在山东一些地区，是四季留居的鸟类。留居的生境有山区和平原，其范围是东经 $117^{\circ}5'$ — $118^{\circ}22'$ 、北纬 $36^{\circ}5'$ — $38^{\circ}16'$ 。