

湖南鸟类新纪录*

邓 学 建

(湖南师大生物系,长沙 410006)

湖南的鸟类先后有 Ogilvie-Grant (1900)、任国荣(1933)、Davis (1951)、梁启燊(1957)¹⁾、郑作新 (1961)¹⁾、沈猷慧 (1960)¹⁾、周昌乔 (1982)、叶贻云(1983)等作过调查,共报道有 238 种与亚种。1978—1990 年我们通过不同地段和生态环境的初步调查,发现有 40 种与亚种为新记录¹⁾,其标本均存放在湖南师范大学生物系。现将这些新纪录报道如下。

1 黄斑苇鸭(指名亚种) *Ixobrychus sinensis sinensis*

♂2, 采于 1987 年 5 月。在湘江长沙江段的芦苇丛中还观察到 5 只 (1988 年 6 月)。系该地区的夏候鸟。

2 白鹳(东北亚种) *Ciconia ciconia boyciana*

♂1、♀2。1984 年 4 月采于沅江洞庭湖,系该地的冬候鸟。

3 黑鹳 *Ciconia nigra*¹⁾

♂1。1949 年 1 月采于湖南南岳山麓林区,系当地的冬候鸟。

4 白琵鹭 *Platalea leucorodia leucorodia*
Linnaeus

1987 年 11 月 7 日见于湘江长沙江段的浅水沙滩上,共 3 只,望远镜观察其特征明显,易与其他鸟类(黑脸琵鹭)区别,系当地的夏候鸟。

5 凤头鹃隼 *Aviceda leucophotes* syama

♂1、♀1。采于桑植县八大公山(1981.8)、大庸市张家界(1981.8,1990.8)、系当地的夏候鸟。

6 黄腹角雉 *Tragopan caboti*

♀1。1984 年 10 月采于道县千家洞林区,

* 沈猷慧、叶贻云、周昌乔等老师参加了部分调查、鉴定工作,特此致谢。

1) 生物系过去采集的标本。

据沈猷慧调查(1981)鄧县桃源洞、绥宁黄桑、宜章莽山等地也有分布,系当地的留鸟。

7 白颈长尾雉 *Syrnaticus ellioti*

♂1、♀1。1987年采于桑植山地林区。吉首大学李鹤鸣、李金声1990年在湘西林区也采到一雌一雄。该鸟系当地的留鸟。

8 白鹇(福建亚种) *Lophura nycthemera fokienensis*

♂3、♀1。采于宁远阳明山(1981.8)、桂东八面山(1984.10)和鄧县桃源洞(1985.3)的山地林区,系当地留鸟。

9 勺鸡(东南亚种) *Puerasia macrolopha darwini*

♂2、♀1。采于桑植八大公山(1981.8)、大庸张家界(1990.8)和鄧县桃源洞等山地林区。系当地的留鸟。

10 凤头麦鸡 *Vanellus vanellus*

♂2、♀1,采于长沙(1987.12,1988.12),还见于涟源等地的河岸边。通常为5—20只不等的小群,系当地的冬候鸟。

11 白领鹑(东南亚种) *Charatrius alexandrinus nipponensis*

♂2、♀2。采于长沙湘江边的浅水滩。每年冬季可见到上百只的大群迁来,1987年12月5日有269只在湘江的桔子洲沙滩上觅食。通常9月中下旬迁来,翌年3月上旬离去,系当地的冬候鸟。

12 尖尾滨鹑 *Calidris acuminatus* (Horsfield)

♂2、♀1。1987年9月采于长沙湘江岸边的浅水滩上。每年9月下旬迁来,翌年4月下旬离去,通常为成群觅食,1987年12月12日在一处观察到438只的大群体。系当地的冬候鸟。

13 白翅浮鸥 *Chlidonias leucoptera*

♂1。1987年5月采于长沙的湘江岸边。当时观察到有137只的低飞群体,系当地的旅鸟。

14 乌鹇(华南亚种) *Surniculus lugubris dicruroides*

♀1。1984年10月采于道县山区的森林

中,系当地的夏候鸟。

15 草鸮(华南亚种) *Tyto capensis chinensis*

♂1、♀2、♀5。分别采于鄧县(1981.5)、浏阳(1982.6)、桂东(1984.8)。系当地的留鸟。

16 红角鸮(华南亚种) *Otus scops mala yanus*

♂2、♀1。采于长沙(1987.10)岳麓山林区。每年4月开始鸣叫占区直至11月。系当地留鸟。

17 短耳鸮(指名亚种) *Asio flammeus flammeus*

♀1。1982年10月采于宜章县山区林地,居留情况还待进一步调查。

18 普通夜鹰(普通亚种) *Ceprimulgus indicus jotaka*

♂2、♀1。采于宁远的九嶷山(1979.8)、道县的千家洞(1982.8)、宜章的莽山(1983.7)等地的山地林区。系当地的夏候鸟。

19 白腰雨燕(华南亚种) *Apus pacificus kanio*

♂5、♀2。采于桑植的八大公山(1981.9)、道县的千家洞(1983.10)、桂东的八面山(1984.8)、宜章的莽山等地的悬崖峭壁上。在桂东的一山洞中观察到一巢群,个体数达800多只。1987年3月在长沙观察到30只的迁飞群体,该鸟系长沙的旅鸟,其他地区的夏候鸟。

20 小白腰雨燕(华南亚种) *Apus affinis subfurcatus*

♀1。1982年8月采于桂东八面山林区的山崖上,系当地的夏候鸟。

21 赤胸啄木鸟 *Dendrocopos cathpharius innixus*

♂1。1981年8月采于桑植县八大公山的山林中。系当地的留鸟。

22 小云雀(华南亚种) *Alauda gulgula coelivox Swinhoe*

♂1、♀1。1987年3月、1988年9月采于长沙湘江沿岸的沙滩上。通常每年10月迁入长沙,翌年3月离去,系当地的冬候鸟。

23 云雀(北方亚种) *Alauda arvensis kiberti*

♂1。1989年10月采于长沙湘江岸边的沙滩上,系当地的冬候鸟。

24 北椋鸟 *Sturnus sturninus*

♂1。1988年5月采于长沙湘江河心的一孤岛的柳林中。系当地的旅鸟。

25 红点颏 *Luscinia calliope*

♂1。1988年5月采于长沙湘江河心的孤岛柳林中。系当地的旅鸟。

26 红尾水鸫(指名亚种) *Rhyacornis fuliginosus fuliginosus*

♂8、♀4。采于双牌(1980.8)、道县(1980.10)、宜章(1982.6)、桑植(1982.8)、桂东(1983.9)、祁县(1989.8)、大庸(1985.5)等地山区的小溪边。系当地的留鸟。

27 黄喉薮鹛(滇西亚种) *Stachyris ambigua planicola*

♀2。1990年2月采于祁县的桃源洞山地林区。其居留情况还待进一步调查。

28 矛纹草鹛(华南亚种) *Babax lanceolatus latouchei*

♂1、♀3。1981年8月采于桑植的八大公山林区。系当地的留鸟。

29 白喉噪鹛(峨眉亚种) *Garrulax albigularis laetus*

♂2、♀1。1981年9月采于桑植县八大公山林区,系当地的留鸟。

30 眼纹噪鹛(四川亚种) *Garrulax ocellatas maculipectus*

♂1、♀1。1981年8月采于桑植县八大公山林区。系当地留鸟。

31 橙翅噪鹛(昌都亚种) *Garrulax ellioti bonvalotii*

♂6、♀4。采于桑植的八大公山(1981.8)、桂东县的八面山(1983.8)等地山林中。系当地的留鸟。

32 黑颏凤鹛(西南亚种) *Yuhina nigri-mentum intermedia*

♂3、♀2。采于大庸张家界(1981.4)、道县

千家洞(1984.10)等地的山地林区。系当地的留鸟。

33 白领凤鹛(指名亚种) *Yuhina diademata diademata*

♀2。1981年8月采于桑植县八大公山林区,系当地的留鸟。

34 棕顶树莺(指名亚种) *Cettia brunni-rons brunni-rons*

♂1。1983年8月采于道县千家洞山地林区,系当地的留鸟。

35 黄腹柳莺 *Phylloscopus affinis*

♀1。1981年8月采于桑植县八大公山的森林中,系当地的留鸟。

36 橙胸姬鹛(指名亚种) *Ficedula strophiasa strophiasa*

♂1。1981年8月采于桑植县的八大公山森林中,系当地的夏候鸟。

37 小仙鹛(指名亚种) *Niltava macgrigoriae macgrigoriae*

♂1。1983年8月采于道县千家洞山地林区系当地留鸟。

38 棕腹仙鹛(西南亚种) *Niltava sundara denosata*

♀1。1981年8月采于桑植县的八大公山森林中,系当地的夏候鸟。

39 北灰鹛 *Muscicapa dauurica*

♂1。1983年8月采于道县千家洞山地林区。系当地的夏候鸟。

40 红胁绣眼 *Zosterops erythropleura Swinhoe*

♂1, 1981年5月采于长沙岳麓山林区,系当地旅鸟。

参 考 文 献

- 1 邓学建 1990 岳麓山地区鸟类资源调查及区系分析 湖南师大学报(自然科学) 13(3): 259—263.
- 2 沈猷慧 1960 洞庭湖的野鸭及其狩猎方法 动物学杂志 4(5): 204—205.
- 3 郑作新 1976 中国鸟类分布名录 1—969 科学出版社.
- 4 ——等 1960 湖南鸟类初步调查(1、非雀形目) 动物学报 12(2): 273—319.
- 5 ——等 1961 湖南鸟类初步调查(II 雀形目) 动物

- 学报 13(1-4): 79-121。
 6 梁启桑等 1958 长沙附近十种常见雀形目鸟类食性的初步报告 动物学杂志 2(4): 212-219。

- 7 一一等 1957 长沙附近的鸟类及其食性的调查研究 湖南师院学报 (自然科学) 2(2): 93-116。

安徽省两栖动物新纪录

有关安徽省的两栖动物,早在 1933 年就由张作干在黄山进行过采集,俟后有成都生物研究所两栖爬行动物研究室(1972、1974)、邹寿昌(1983)、张服基等(1985),分别在皖南黄山地区和皖西大别山区作了调查,并记载了全省两栖动物共 29 种,分隶于 12 属 8 科 2 目。

笔者于 1988 年 5 月在大别山区的岳西县美丽地区进行了动物采集。经鉴定,发现其中有 3 种两栖动物系安徽省新记录,特简报于后。

1. 细痣疣螈 (*Tylotriton asperimus*)
 已知细痣疣螈间断分布在四川、贵州、广西、广东和甘肃南部等长江以南地区,这次发现说明本种迄今为止的分布北界为安徽省的大别山区。

本种在我国共有 2 个亚种:指名亚种和平武亚种,后者的分布仅限于四川平武地区。安徽省捕获的 6 尾细痣疣螈为指名亚种,其量度为:全长 123.6—140.3 毫米、头体长 64.0—71.9 毫米、头长 17.5—21.6 毫米、头宽 15.0—19.0 毫米、吻长 4.8—5.1 毫米、眼间距 7.0—8.2 毫米、眼径 3.6—4.3 毫米、前臂长 13.8—17.1 毫米、后肢长 15.9—18.4 毫米、腋臂长 28.9—32.9 毫米、尾长 56.8—67.5 毫米、尾高 7.5—9.1 毫米。

2. 秦岭雨蛙 (*Hyla tsinlingensis*) 秦岭雨蛙是刘承钊等于 1966 年发表的新种。近 20

年来已于湖北和安徽等省先后被发现,使其分布区自西扩延至东界的大别山区。8 只标本的量度为:头长 10.5—11.8 毫米、吻长 3.9—4.4 毫米、眼间距 2.0—2.8 毫米、眼径 5.4—6.1 毫米、鼓膜 2.0—2.4 毫米、体长 35.5—41.6 毫米、前肢长 16.0—20.0 毫米、后肢长 53.2—58.1 毫米。

3. 黑点树蛙 (*Rhacophorus nigropunctatus*) 黑点树蛙因其体形和腰侧、后肢饰有褐色圆斑而酷似雨蛙,然而该蛙于繁殖季节常在草丛中产卵于卵泡内,可资两者区别。本次在大别山发现该种是自 1962 年刘承钊等发表新种至今,在模式标本产地贵州省西部以外地区的唯一报道。5 只标本的量度为:头长 13.5—14.1 毫米、吻长 5.0—6.0 毫米、眼间距 4.7—5.0 毫米、眼径 4.8—5.9 毫米、鼓膜 1.7—2.5 毫米、体长 38.0—44.5 毫米、前臂及手长 18.1—22.3 毫米、后肢长 46.2—58.2 毫米。

细痣疣螈、秦岭雨蛙和黑点树蛙在安徽省内的发现,一方面丰富了该省动物区系的组成,另一方面,南北动物于此混杂分布的现象,也进一步显示出该省包括大别山区在内,是古北界和东洋界的交界过度地带,这个地带跨越于秦岭、淮河至长江之间,而并非一条狭窄的分界线。

(赵肯堂 苏州铁道师范学院, 215005 胡小龙 安徽大学)