

山东发现紫啸鸫和白翅岭雀

关键词 紫啸鸫, 白翅岭雀 长岛

1 紫啸鸫 *Myiophonus c. caeruleus*

1991年9月20日, 在大黑山岛张网捕鸟

环志时,猎手马昌仁同志捕获一只雄性紫啸鸫,其体重 182 克、全长 313 毫米、嘴峰 28 毫米、翅长 178 毫米、尾长 112 毫米、跗蹠 55 毫米。头部、前额基部、眼先纯黑色。全身羽毛为深紫蓝色,各羽先端具闪亮的淡紫色的滴状斑点,且在下体、喉、胸部更明显。翅飞羽黑褐色,飞羽外翮羽缘呈鲜亮的紫蓝色边缘。翅上覆羽黑褐色,各羽端缀宽阔的蓝色光泽,中覆羽先端缀淡紫色白色斑点。尾羽紫蓝色。下体、尾下覆羽纯黑。嘴和脚均为黑色。虹膜暗褐色。其不同于 *M. c. eugenei* 亚种,翅上中覆羽无白色端斑和 *M. c. temminckii* 亚种嘴为黄色。

采集地为山岭、黑松与刺槐混交林内,从时间分析是从北向南迁徙期,为该区的旅鸟。

2 白翅岭雀 *Leucosticte arctoa brunneonucha*

我国境内白翅岭雀有两个亚种, *L. a. arctoa* 亚种分布于新疆北部阿尔泰山脉地区,体型大、翅飞羽无玫瑰红色羽缘。 *L. a. brunneonucha* 亚种体型小,翅飞羽有玫瑰红色,分布于东北、河北。

1988 年 11 月 24 日,范强民同志采到白翅岭二只,外部测量见表 1。其形态:雄鸟眼先、

表 1 白翅岭雀量衡度 (单位:克·毫米)

性别	体重	体长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂	31	160	10	100	73	16
♀	30	165	11	103	67	17

脸颊部黑褐色,耳羽黑褐色染玫瑰红。后头上背锈褐色,背肩部淡棕褐色,各羽间具有宽阔的黑褐色纵纹。腰、尾上、下覆羽均黑褐色,次端斑玫瑰红色。飞羽外翮羽缘缀玫瑰红色。下体、颏、喉部和胸深褐色,各羽端缘灰白色并微沾粉红色。上嘴橙黄色,下嘴尖近黑褐色、余橙黄色。腿、脚、爪黑色,虹膜暗褐色。雌鸟较雄鸟色淡。

采集地生境为海岛山林缘水库边,共有 10 多只,同北朱雀、燕雀一起活动、饮水。据采集时间和以后观察,该鸟为长岛自然保护区的冬候鸟。

致谢 承蒙山东省泰安林校杜恒勤副教授指导并鉴定标本。

(范强东 赵方 山东省长岛候鸟保护环志中心站 265800)