

# 挂墩鸦雀分布新报

廖晓东

(湖南郴州教育学院 郴州 423000)

关键词 挂墩鸦雀 分布 湖南

挂墩鸦雀 (*Paradoxornis davidianus*) 过去在国内仅见于福建西北部挂墩一带, 据 Gee *et al.* (1926—1927), 此鸟亦见于浙江东北部, 尚待证实。由于该鸟的分布区十分狭窄, 在动物分布上被列为局部分布的典型例证。

湖南莽山自然保护区位于南岭山脉中段, 骑田岭支脉, 东经  $112^{\circ}43'$ — $113^{\circ}0'$ , 北纬  $24^{\circ}52'$ — $25^{\circ}3'$ 。笔者于 1992 年—1994 年从事“湖南莽山鸟类资源调查”时, 在莽山大水江小河边发现挂墩鸦雀并采到标本。大水江海拔 1250 米, 是保护区核心区南端地势较为平缓的山谷地带, 小河宽约 15 米, 沿岸生有密灌木丛和竹丛, 周围山坡为中山带常绿阔叶林。1992 年 3 月 7 日上午 11 时, 正值春寒冻雨天气, 发现两只挂墩鸦雀在灌木丛和竹丛边缘追逐戏飞, 性活跃, 不甚畏人。时而停落于突出的高枝上, 抖翅鸣叫, 彼此呼应, 鸣叫声“喳喳……”较棕头鸦雀略粗, 单调而急促。于竹丛中安

放鸟网, 次日捕获一雄体, 上网高度 1.5 米。

量衡度	体重: 8.5g	嘴峰: 9mm
♂(1)	体长: 96.0mm	跗蹠: 18mm
	翅长: 52.5mm	尾长: 43mm

形态: 额、顶、颊、颈、颈侧浅栗红色; 背和上腰棕灰, 翅羽灰褐, 外缘浅棕黄色; 下腰和尾上覆羽浅棕黄; 尾棕褐, 尾羽外缘棕色; 眼先黄白色, 羽端部黑色, 向后延伸在眼上方形成一窄细黑纹; 颊、喉黑色, 羽端缀白。胸灰白, 腹棕灰, 尾下覆羽浅棕黄色。虹膜褐色, 嘴淡肉红色; 脚、趾和爪肉红色。与“中国动物志鸟纲”(1987)所描述的福建挂墩标本相比, 莽山标本的头、颈部栗红色较淡, 下喉未见淡黄色横带。新鲜标本的脚、趾、爪皆呈肉红色, 而非灰褐色(标本存放于北京师范大学生物系)。

挂墩鸦雀在莽山数量很少, 我们仅于 1992 年 5 月和 1994 年 9 月间分别在保护区的茅坪和大塘坑(海拔约 110 米)见到该鸟以数只成小

群在溪流附近的林间活动,估计属于当地的繁殖鸟类。

挂墩鸦雀共有三个亚种,指名亚种 (*P. d. davidianus*) 见于我国福建挂墩,另外两个亚种, *P. d. tonkinensis* 和 *P. d. thompsoni*, 分布于中

南半岛的越南北部和老挝、泰国、缅甸北部。有关莽山挂墩鸦雀的亚种分类还有待进一步研究确定。湖南莽山在地理位置上与福建挂墩相隔较远,两地间的挂墩鸦雀究竟是连续分布还是间断分布仍需深入细致的调查。