

记录。

1 白额鸢 标本号 006, 1993 年 11 月 16 日采于宜丰县郊。度量衡: ♀, 体重 280g, 体长 503mm, 翅长 340mm, 尾 76mm, 嘴峰 41mm, 跗蹠 47mm。剖胃仅见数片竹叶, 为迷鸟。

2 鹰雕 标本号 043, 1993 年 12 月 31 日采于宜春市洪江乡边山村树上。度量衡: ♂, 体重 1500g, 翅长 432mm, 尾 315mm, 嘴峰 30mm, 跗蹠 102mm。

3 灰背棕鸟 标本号 204, 1994 年 6 月 8 日采于铜鼓县棋坪镇易溪农田电线上。度量衡: ♀, 体重 42g, 体长 190mm, 翅长 99mm, 尾 54mm, 嘴峰 18mm, 跗蹠 25mm。

4 黑领棕鸟 标本号 209—212, 1994 年 1 月和 5 月, 分别采于丰城市石江乡和奉新县赤田

乡农田村落附近。度量衡: 3♂, 体重 120—166g, 体长 275—295mm, 翅长 150—165mm, 尾 91—106, 嘴峰 25—26mm, 跗蹠 39—45mm; ♀, 体重 164g, 体长 276mm, 翅长 160mm, 尾 92mm, 嘴峰 26.5mm, 跗蹠 49mm。

5 灰背燕尾 标本号 251, 1993 年 12 月 30 日采于宜春市洪江乡塘佳山溪。度量衡: ♂, 体重 30g, 体长 216mm, 翅长 92mm, 尾 125mm, 嘴峰 14mm, 跗蹠 31mm。

标本存于江西省科学院动物标本室。

致谢 宜春地区林业局资助项目, 标本鉴定承王岐山教授和诸葛阳教授指导。

(戴年华 刘玮 蔡汝林 林强华 江西省科学院
生物资源研究所 南昌 330029)

穿山甲外伤感染及自身致敏性皮炎处理一例*

李文军

张新凯

(中国科学院动物研究所 北京 100080)

(车八岭国家级自然保护区)

摘要 因外伤感染而引发自身致敏性皮炎的一只雄性亚成体中国穿山甲用下述方法治愈: 用双氧水和醋酸洗必泰清洗创面, 用红汞和金霉素软膏外敷, 并喂服抗组织胺药物及镇静剂、维生素 C; 7d 后再将抗组织胺药、皮质类固醇激素、抗菌药及大剂量维生素 C 等拌入牛奶每日喂服两次, 6d 后穿山甲痊愈。愈后将其放生到自然栖息地, 两周后再次捕回时未发现相关病兆。

关键词 中国穿山甲 外伤感染 皮炎

1993 年 4 月, 车八岭国家级自然保护区接到韶关市林业局没收的 6 只穿山甲 (*Manis pentadactyla*), 并将它们养在保护区饲养场内作放生前的救治。饲养期间主要以牛奶及肉类等饲喂。

两周后, 两只穿山甲突然死亡。另一雄性活体腹部、头面部以及四肢的表皮及组织均有大小不同的同样溃疡点, 皮疹多形、边缘不清, 溃疡点红肿糜烂, 渗出液明显带有浓性粘稠液。再两天后病变加剧, 皮疹点扩散, 溃疡面积增大, 它不断用嘴吮吸患处, 用手触摸到其患处, 穿山甲明显不安并躲避。据此, 我们认为该个体患有外伤感

染没有及时控制而引起的自身致敏性皮炎。这可能是由于被捕捉时造成的外伤被细菌感染; 同时, 饲养圈舍地面石灰成分重而且较潮湿, 致使它出现自身致敏性皮炎。^[1-5]

针对这些情况, 我们首先清洗和消毒圈舍, 并在地面铺上一层 2—3cm 厚的干燥沙土, 1—2d 更换一次, 以保持干燥。再者, 我们用抗组织胺药物 (扑尔敏 Chlorpheniramine

* 国家科委“八五”攻关项目子专题“中国穿山甲的生态学与持续管理”的部分内容。

收稿日期: 1993-07-05, 修回日期: 1994-09-11