

后腔静脉的腹面向首侧行,两千分别注入乳糜池的尾端。乳糜池居主动脉背面的正中,自第4腰动脉处起始,然后上行至胸腔(见图3)。

3 讨论

据 Глаголев^[1]记载,狗的淋巴结数全身可达60个,本文观察腹、盆部器官淋巴结最多可达32个(上腹部另文报道)。本文所见的两个肠系膜淋巴结,分别位于肠系膜上血管的左侧和右侧,为最大的淋巴结。而 Климов^[2]则认为肠系膜淋巴结为集中于肠系膜根部的一组结。Крылова^[3]认为肠系膜淋巴结是位于肠系膜根附近的两组结,相应接受肠系膜两叶浆膜的淋巴管。本文观察所见,淋巴结不在肠系膜根附近,而在血管干附近,位于系膜内,主要接受小肠及大肠的结肠左曲以前的淋巴管和胰十二指肠肠淋巴结的输出管。Автократов^[4]认为肉食动物的特征是肠系膜淋巴结被 Aselli's 胰淋巴结所代替。而本文却在家犬肠系膜血管附近见到了左、右两个大而长的肠系膜淋巴结。Kuznetsov^[5]用70条狗研究发现,6例肾淋巴管从肾实质直接注入乳糜池,而 Глаголев 和

杨书善等^[6]认为,少数肾脏的淋巴管可不经淋巴结直接注入静脉。本文观察发现,家犬肾淋巴管有的不经过淋巴结,而直接注入乳糜池,尤其多见于左侧。

参 考 文 献

- 1 Глаголев П.А. и В.И. Ипполитова. Система органов лимфодренажа. Из Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии сельхозгиз. Москва, 1956. 386.
- 2 Климов А.Ф. И А.И.Акаевский. Лимфатическая система собаки. Из Анатомия домашних животных. Москва Лис, 1955, 203.
- 3 Крылова Н.В. Некоторые закономерности морфологии выносящих сосудов висцеральных лимфатических узлов брюшной полости млекопитающих. Архив А.Г.Э. 1959, 37 10: 67.
- 4 郭和以、王建辰译. 家畜解剖学. 上海: 高等教育出版社, 1955, 285—298.
- 5 Автократов Д.М. Анатомия домашних животных. 1956. 291—309.
- 6 Kuznetsov A. V. Extra-Organiclymphatic vessels and regional lymph nodes of the kidneys in dogs. Arkh A. G. E, 1987, 33(7): 37—39.
- 6 杨书善, 张红旗等. 狗肾的淋巴流向. 解剖学杂志, 1993, 6(4): 360—361.

《宜春地区野生动物——鸟类·兽类》一书介评

由岳惠群、戴年华等编著的《宜春地区野生动物——鸟类·兽类》一书,于1996年1月由江西高校出版社出版并发行。全书分总论、各论和附录三部分。总论概述了研究历史、自然概况、区系特点、动物生态地理分布、资源评价及合理利用;各论记述了237种鸟类和59种兽类的形态、习性、分布、经济、生态意义及受保护状况;附录江西省鸟兽名录(525种)。书末附有彩图80幅。全书31万字。该书内容丰富,资料翔实,图文并茂,语言精练,文字畅通,结构严谨,装帧精美。

该书系作者根据历史文献资料,并在此基础上,对本区鸟兽资源进行了集中考察,取得了丰富的资料,编写而成。编写工作独辟蹊径,突破了地方动物志版本传统模式,从实际、实用出发,把野外收集的大量标本和生态资料加以系统论述,为当地保护和合理利用野生动物资源提供了科学依据;引导读者正确使用动物药材;用辩证的观点评价野生动物的益害问题。它是第一部系统全面地论述宜春地区鸟兽资源的专著,也是有关江西鸟兽资源的重要专著,对我国即将全面开展的野生动物普查工作起推动作用。并在区域性动物资源考察及论著中,从科学性、实用性以及科普方面作出了有益的探讨,实是一本很有实用价值的好书。

(邓宗觉,南昌大学生物科学工程系 330047)