

湖北省发现小黑领噪鹛

Lesser Necklaced Laughingthrush (*Garrulax monileger*) Found in Hubei Province

2015年8~11月,在湖北神农架森林生态系统国家野外科学观测研究站,3次发现一种此前未监测到的鸟类,鉴定为小黑领噪鹛(*Garrulax monileger*)。8月5日,在湖北宜昌市兴山县龙门河村黄崩口沟口西侧公路上方山坡(31°19'37"N, 110°28'59"E, 海拔1292 m),小溪边的化香树(*Platycarya strobilacea*)林发现5只小黑领噪鹛并拍摄照片(图1);10月21日在龙门河东湾白栎子树包(31°19'32"N, 110°31'19"E, 海拔1691 m)的巴山水青冈(*Fagus pashanica*)林发现3只小黑领噪鹛与15只黑领噪鹛(*G. pectoralis*)的混群;11月2日在龙门河小东湾(31°19'27"N, 110°29'25"E, 海拔1358 m)的亮叶桦(*Betula luminifera*)林又发现2只小黑领噪鹛与4只黑领噪鹛的混群。



图1 小黑领噪鹛 Lesser Necklaced Laughingthrush

小黑领噪鹛隶属雀形目画眉科(Passeriformes: Timaliidae)。中等体型,全身大都棕橄榄褐色,后颈棕红色,胸具黑圈。眼上有白色眉纹,颊部有较小的白斑,虹膜黄色,嘴黑褐色,脚淡褐色。小黑领噪鹛与黑领噪鹛是一对亲缘种,外形和羽色非常相似,野外易混淆,且两物种具有混群生活的习性(郑作新 1963)。两者形态特征的主要区别为小黑领噪鹛颊部白斑较小,黑领噪鹛颊部白斑较大且其上有黑色细纹。

小黑领噪鹛主要分布在喜马拉雅山脉至中国南方、缅甸及中南半岛至马来半岛。在我国见于云南西部和南部、湖南、安徽、江西、浙江、福建、广东、广西、海

南、江苏、上海、西藏墨脱(郑作新等 1987, 赵正阶 2001, 许鹏等 2009, 郑光美 2011, 刘迺发等 2013)。2009年3月和2010年2月雷波(网名: 独孤秋风客)和王雪峰(网名: 拉丁)先生分别在十堰市东风汽车公司第一中学后山和十堰四方山拍摄到疑似小黑领噪鹛照片,并上传到武汉观鸟会网站上(<http://www.whbws.com/portal.php>)。本文关于小黑领噪鹛在湖北新发现的正式报道有利于增进对该物种分布的认识。

王冰鑫^{①②} 崔继法^{①③} 陈文文^① 赵常明^① 徐文婷^① 熊高明^① 谢宗强^① 周友兵^{①*}

① 中国科学院植物研究所植被与环境变化国家重点实验室 北京 100093; ② 中国科学院大学 北京 100049;

③ 安徽农业大学 合肥 230036

基金项目 国家自然科学基金项目(No. 31470491), 环保公益性行业科研专项(No. 201309039);

* 通讯作者, E-mail: zhoub@ibcas.ac.cn;

第一作者介绍 王冰鑫, 女, 硕士研究生; 研究方向: 动植物协同进化与森林更新; E-mail: wbx_20080621@126.com。

收稿日期: 2016-01-22, 修回日期: 2016-03-06 DOI: 10.13859/j.cjz.201603023