

云南盈江发现白翅栖鸭

White-winged Duck *Asarcornis scutulata* Found in Yingjiang, Yunnan Province

2019年4月22日,杜银磊等在云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县那邦镇那邦村一水塘(24°42'58.40" N, 97°34'08.70" E, 海拔239 m)拍摄到一只鸭类(见封面)。该鸟通体棕褐色;头、颈褐色并杂有白色点斑,而不全为黑色,与疣鼻栖鸭(*Cairina moschata*)不同(Johnsgard 2010);颈部领环黑色,下体深色,与瘤鸭(*Sarkidiornis melanotos*)有别(Johnsgard 2010);飞行时,可见翼上的白色覆羽与蓝紫色的翼镜形成鲜明反差),翼下的白色覆羽与黑色的飞羽形成鲜明对比(图1);嘴、脚橘红色,虹膜红色。经查阅相关参考文献(Delacour 1959, Carboneras et al. 2019),鉴定为白翅栖鸭(*Asarcornis scutulata*)。

白翅栖鸭隶属雁形目(Anseriformes)鸭科(Anatidae),单型种(Dickinson et al. 2013)。该种见于不丹(Choudhury 2007)、印度东北部、孟加拉国、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、马来西亚和印度尼西亚,其中在与盈江临近的缅甸八莫等地区有分布(BirdLife International 2001)。白翅栖鸭常见于中低海拔的林间湿地或河流,有时分布海拔可达1500 m(Robson 2005),最高记录海拔为1705 m(Srinivasan et al. 2010)。其在全球的种群数量估计为250~999只,种群现状在《世界物种红色名录》里被评估为濒危等级(BirdLife International 2017),已列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录I(CITES 2017)。2019年4月23日起未能再发现该个体踪迹,该种在云南境内的居留状况尚难以判定。

经查阅相关文献(杨岚等 2004, 杨晓君等 2017, 郑光美 2017),此次发现系白翅栖鸭在云南,也是在我国藏南地区(MacKinnon et al. 2000, BirdLife International 2001)之外的首次分布记录。

封面动物 白翅栖鸭, 2019年4月22日杜银磊摄于云南盈江。



图1 白翅栖鸭(杜银磊摄)

Fig. 1 White-winged Duck *Asarcornis scutulata* (Photo by DU Yin-Lei)

张利祥^① 曾祥乐^② 杜银磊^② 王洁^③ 张琦^{④*}

① 云南省铜壁关省级自然保护区盈江管护分局 盈江 679300; ② 云南省盈江观鸟协会 盈江 679300;

③ 中国科学院昆明动物研究所 昆明 650223; ④ 云南省蒙自市森林公安局 蒙自 661199

* 通讯作者, E-mail: qizhang@vip.163.com;

第一作者介绍 张利祥, 男, 工程师; 研究方向: 野生动植物保护; E-mail: zhanglixiang_3@163.com。

收稿日期: 2019-05-06, 修回日期: 2019-07-12 DOI: 10.13859/j.cjz.201906019