

参 考 文 献

- [1] 周放,曹指南,潘国平等. 北部湾北部沿海水鸟的初步研究. 见: 中国鸟类学会水鸟组编. 中国水鸟研究. 上海: 华东师范大学出版社, 1994, 147 ~ 151.
- [2] 广西壮族自治区林业厅主编. 广西自然保护区. 北京: 中国林业出版社, 1993, 123 ~ 124.
- [3] 周放,周解,韦振逸等. 十万大山地区野生动物研究与保护. 北京: 中国林业出版社, 2004, 20.
- [4] 郑光美. 中国鸟类分类与分布名录. 北京: 科学出版社, 2005, 1 ~ 361.
- [5] 蒋爱伍,周放,韦振海等. 广西大苗山“打鸟坳”趋光性鸟类调查. 动物学杂志, 2006, 41(6): 127 ~ 131.
- [6] 王紫江,廖峻涛,张词祖. 云南鸟类. 昆明: 云南人民出版社, 2002, 1 ~ 239.
- [7] 王紫江,仇国新,吴金亮等. 滇西鸟吊山夜间移动的鸟类的初步研究. 见: 高玮主编. 中国鸟类研究. 北京: 科学出版社, 1991, 208.
- [8] 杨荣,王紫江,赵正军等. 云南巍山鸟道雄关 2003 年度鸟类环志研究简报. 四川动物, 2004, 23(2): 120 ~ 122.

白腰燕鸥 *Sterna aleutica*

2009 年 8 月 31 日, 江西省科学院林剑声与厦门观鸟会林植、陈志鸿等一行 6 人在福建漳浦菜屿列岛 (23°47'04" N, 117°40'27" E) 开展燕鸥类调查时, 在这一海域记录到 10 多只白腰燕鸥 (*Sterna aleutica*) 从近海海面飞过, 并拍摄到清晰的照片。此次所见白腰燕鸥, 均是在海面上活动, 未发现停栖于周边岛屿; 另外, 我们 2009 年 5 ~ 7 月在菜屿列岛做燕鸥类的繁殖调查时, 并未发现有白腰燕鸥出现。

白腰燕鸥, 又称阿留申燕鸥, 中等体型, 体长约 38 cm; 繁殖于西伯利亚、阿留申群岛及阿拉斯加等地, 越冬于南方水域。白腰燕鸥与普通燕鸥东北亚种 (*S. hirundo longipennis*) 的非繁殖羽个体相似, 二者均具白色的腰际和前额, 但白腰燕鸥次级飞羽末端具黑色横带, 是为对该种明显而可靠的鉴别特征。

白腰燕鸥迟至 2000 年才被收入中国鸟类名录, 所依据的是在香港和台湾的观察记录^[1,2]。香港 1992 年秋季的记录曾多达 200 余只, 此后每年均有出现, 且秋季较为常见^[3,4]。台湾观鸟者在台湾台南县外海也时有观察记录^[5]。另外, 查阅 < 中国鸟类观察 > 2002 ~ 2008 年间的全部记录, 未发现有关于白腰燕鸥在中国大陆地区的记载。

据此, 此次记录可作为白腰燕鸥在中国大陆有分布的第一笔确切纪录。

(封面照片: 白腰燕鸥 *Sterna aleutica*; 林剑声摄)

参 考 文 献

- [1] 郑作新. 中国鸟类种和亚种分类名录大全 (修订版). 北京: 科学出版社, 2000, 49.
- [2] 约翰·马敬能, 卡伦·菲利普斯, 何芬奇. 中国鸟类野外手册. 长沙: 湖南教育出版社, 2000, 176, Pl. 48.
- [3] 尹琏, 费嘉伦, 林超英. 香港及华南鸟类. 香港: 香港政府印务局, 1994, 116 ~ 117.
- [4] 尹琏, 费嘉伦, 林超英. 香港及华南鸟类. 香港: 香港政府印务局, 2006, 126.
- [5] 颜重威, 诸葛阳, 陈水华. 中国的海鸥和燕鸥. 台湾: 国立凤凰谷鸟园, 2006, 149 ~ 150.

林剑声 陈志鸿 林植 江航东 朱敬恩

(江西省科学院 南昌 330029; 厦门观鸟会 厦门 361000)